

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
по медицинскому применению лекарственного средства
ДЕКСПАНТЕН®

Прочтите внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать прием лекарственного средства. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Это лекарство назначено лично Вам, его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Международное непатентованное название: Dexpantthenol.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения 50 мг/г.

Описание лекарственной формы: гомогенная мазь белого цвета с желтоватым оттенком со специфическим запахом ланолина.

Состав: 1 г мази в качестве активного вещества содержит 50 мг декспантенола.

Вспомогательные вещества: ланолин, парафин жидкий, парафин мягкий белый, протегин NX, миндалевое масло, воск пчелиный белый, цетиловый спирт, стеариловый спирт, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: ранозаживляющие средства.

Код ATХ: D03A X03

Фармакологические свойства

Декспантенол в клетках кожи превращается в водорастворимый витамин группы В - пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота играет важную роль в клеточном обмене веществ. Она необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек. Действие декспантенола сходно с действием пантотеновой кислоты, однако он быстрее всасывается при местном применении. Декспантенол имеет местный антираздражающий и сильный заживляющий эффекты. Возобновляет поврежденные ткани, улучшает обмен веществ в коже, оказывает некоторое противовоспалительное действие.

Показания к применению

Активизация процессов заживления при мелких повреждениях кожи: легких ожогах и ссадинах; при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения; при хронических язвах, пролежнях, анальных трещинах, пересадке кожи; при лечении кортикостероидами.

Уход за сухой и потрескавшейся кожей.

Профилактика и лечение опрелостей у грудных детей.

Регулярный уход за молочными железами в период кормления грудью, лечение болезненности или трещин сосков.

Способ применения и дозировка

Лекарственное средство предназначено только для наружного применения у детей и взрослых.

Мазь наносят на пораженные участки кожи однократно или несколько раз в сутки в зависимости от необходимости.

При уходе за грудным ребенком мазь следует наносить при каждой смене подгузника (пеленки).

При кормлении грудью наносить на соски после каждого кормления.

Длительность лечения зависит от вида и течения заболевания.

Побочное действие


СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

24-04-2020

от «_____» 20 г. № 494



Перечисленные ниже нежелательные реакции основаны на ~~спонтанных сообщениях~~ ~~регистрации обращений~~ ~~от представителей организаций~~ ~~и граждан Беларусь~~.
Определить точную частоту встречаемости каждого из них не представляется возможным.
Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе кожные – раздражение кожи, зуд, сыпь, крапивница, эритема, контактный и аллергический дерматит, экзема, пузырьковая сыпь.

В состав лекарственного средства ДЕКСПАНТЕН® входит ланолин, цетиловый и стеариловый спирты, которые могут вызвать кожные реакции на месте применения, например, контактный дерматит.

Сообщение о нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного средства с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения польза/риск лекарственного средства. В случае возникновения нежелательных реакций, перечисленных в данном листке-вкладыше, а также не упомянутых в нем, или в случае неэффективности препарата необходимо, в первую очередь, незамедлительно сообщить об этом лечащему врачу. Также можно позвонить по номеру телефона компании-производителя лекарственного препарата, указанному в разделе «Информация о производителе» либо сообщить о нежелательной реакции/неэффективности в Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (<https://www.rceth.by/>).

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата

Передозировка

Декспантенол считается нетоксичным и хорошо переносится даже при нанесении мази на большую поверхность кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано

Другие взаимодействия

При нанесении мази в области гениталий или ануса следует иметь в виду, что вспомогательные вещества препарата снижают прочность латексных презервативов, что снижает их безопасность.

Меры предосторожности

Причины предосторожности
Следует избегать попадания препарата в глаза.

Беременность и кормление грудью

Беременность / Кормление грудью
ДЕКСПАНТЕН® можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. При нанесении мази на соски необходимо удалять ее остатки перед кормлением.

Влияние на способность управления транспортными средствами и другими сложными механизмами

Не оказывает влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами

Форма выпуска

Форма выпуска
По 15 г, 30 г, 50 г и 100 г в тубах из полимерных материалов или по 30 г, 50 г и 100 г в тубах из комбинированного материала с бушонами. Тубу вместе с листком-вкладышем помешают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Срок годности указан на упаковке.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Информация о производителе

ООО «Фармтехнология», 220024 г. Минск, ул. Корженевского, 22.
Тел./факс (017) 309 44 88, e-mail: ft@ft.by.

