

информация для пациента лекарственного средства

ДОКТОР ТАЙСС

Эвкалипт

Лекарственная форма
Мазь для наружного применения

Состав**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

от «22» 04 2020 г. № 469КЛС № 3 от «04» 04 2020 г.**Активные компоненты**

20 г

50 г

Эвкалиптовое масло	1,50	3,75
Сосны обыкновенной масло	1,50	3,75
Камфора	1,00	2,50

Неактивные ингредиенты

Кукурузное масло, рафинированное	9,60	24,00
Пчелиный воск желтый	4,80	12,00
Твердый жир	1,60	4,00

Описание

Однородная полупрозрачная мазь светло-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа и код ATXПрочие средства, применяемые для лечения простудных заболеваний.
Код ATX: R05X**Фармакологические свойства**

Лекарственное средство обладает местнораздражающим ("отвлекающим"), противовоспалительным и антисептическим действием. Лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества, фармакокинетические исследования не проводились.

Показания к применению

Применяют в качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний. Применение по указанным показаниям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Повреждение кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках нанесения лекарственного средства (пиодермия, дерматит, экзема).

Эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные), склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш. Беременность или кормление грудью. Детский возраст до 18 лет.

Применение во время беременности и в период лактации

Применение лекарственного средства у беременных и кормящих женщин противопоказано, поскольку безопасность применения не установлена.

Применение у детей

В связи с отсутствием адекватных данных применение мази детям до 18 лет не рекомендовано. При нанесении мази на область лица или шеи у детей младшего возраста могут развиться рефлекторный бронхоспазм, ларингоспазм и апноэ.

Способ применения и дозы

Наружно: При острых респираторных заболеваниях небольшое количество мази нанести на кожу груди или спины. При нанесении мази следует избегать травмирующих кожу движений. Область нанесения мази можно прикрыть чистой сухой тканью (ткань рекомендуется прикладывать неплотно).

Применять не более 4 раз в сутки. Длительность лечения - 3-5 дней.

Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Не наносить на кожу лица (крылья носа), учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСЛЕДНИЙ ИЗБОЛГАТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Республиканский Государственный

Институт Технологии и Экономики

Побочное действие

Возможны аллергические (раздражение кожи, эритема, сыпь, шелушение, зуд, жжение, изменение цвета кожи, крапивница, контактный дерматит) и бронхоспастические реакции.

В связи с содержанием камфоры возможно возникновение головной боли, головокружения, судорог.

При появлении побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение мази и обратиться к лечащему врачу.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза - риск». Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>).

Передозировка

При местном применении мази возможно усиление симптомов побочного действия. В случае приема мази внутрь необходимо обратиться к врачу. При случайном приеме внутрь симптомы передозировки включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе), неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение жара/приливы, судороги, угнетение дыхания и кома), нарушение функции почек. Лечение симптоматическое. При передозировке не следует вызывать рвоту из-за рисков, связанных с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма, который может привести к летальному исходу у детей младшего возраста.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Исследования по оценке влияния применения лекарственного средства на способность к вождению автотранспорта и работу с движущимися механизмами не проведены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется применять одновременно с другими мазями и кремами.

Особые указания

Не допускать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки полости рта и носа. Только для наружного применения. Перед использованием попробуйте мазь на

4679 - 2020

небольшом участке кожи. Обработка больших поверхностей тела запрещается. Мазь можно применять только на чистой неповрежденной коже. Руки после использования мази необходимо тщательно вымыть теплой водой и мылом.

После нанесения мази на кожу наблюдается локальное повышение температуры и покраснение кожи, одновременно появляется ощущение тепла или холода, которое в течение одного часа постепенно исчезает. При нанесении мази на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение мази и немедленно обратиться к врачу. После местного применения средств, содержащих ментол, были сообщения о развитии ожогов. После нанесения мази не рекомендуется применять местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций. Пациентам с повышенной чувствительностью не следует принимать горячий душ или ванну до или после применения мази. Из-за опасности фотосенсибилизации избегать пребывания на солнце. Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появления мокроты с примесью гноя или крови), следует обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Форма выпуска

Мазь в банках по 20 г или 50 г в банки из коричневого стекла, завинчивающиеся пластиковой крышкой. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условие отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Dr.Taiss Naturwaren GmbH
Мишелинштрассе 10,
66424 Хомбург, Германия

Представитель/импортер в Республике Беларусь

ИООО «НАТУСАНА»

220140, г. Минск

ул. Лещинского, 8/4-1, тел./факс: +375 17 399 69 65