



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
МЕТРОНИДАЗОЛ, 10 мг/г,**

**гель для наружного применения
Действующее вещество: Metronidazole**

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш,
поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат МЕТРОНИДАЗОЛ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата МЕТРОНИДАЗОЛ
3. Применение препарата МЕТРОНИДАЗОЛ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата МЕТРОНИДАЗОЛ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат МЕТРОНИДАЗОЛ,
и для чего его применяют**

Метронидазол – синтетическое противомикробное и противопротозойное средство широкого спектра действия из группы имидазолов.

МЕТРОНИДАЗОЛ применяется для местного лечения розовых угрей (в т.ч. постстероидных).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата МЕТРОНИДАЗОЛ**

Не принимайте МЕТРОНИДАЗОЛ, если:

- у Вас аллергия на метронидазол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша)

Другие препараты и препарат МЕТРОНИДАЗОЛ

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата МЕТРОНИДАЗОЛ проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у Вас есть или были факторы риска:

- Вы подвергались гемодиализу
- Вы принимаете пероральные антикоагулянты (типа варфарина)
- Вы принимаете фенobarбитал

Использование препарата МЕТРОНИДАЗОЛ с алкоголем:

Вам рекомендуется не употреблять алкоголь во время лечения этим препаратом из-за возможности возникновения побочных реакций, таких как головная боль, тошнота, помутнение зрения, слабость, спутанность сознания или затруднение дыхания.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. На сегодняшний день нет опыта применения препарата во время беременности.

Важная информация о некоторых вспомогательных веществах:

Препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи. Парагидроксибензоаты, присутствующие в геле, могут вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

3. Применение препарата МЕТРОНИДАЗОЛ

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

МЕТРОНИДАЗОЛ следует применять:

В среднем срок лечения составляет от 3 до 4 месяцев. Рекомендуемая продолжительность лечения не должна превышать. Однако продолжительность лечения может быть увеличена еще на 3-4 месяца лечащим врачом в зависимости от тяжести состояния пациента. Препарат следует наносить тонким слоем на пораженные участки кожи дважды в день, утром и вечером. После нанесения лекарственного средства пациенты могут использовать некомедогенную косметику и косметические средства, не содержащие вяжущие вещества. Применение у детей не рекомендуется. Безопасность и эффективность не установлены.

Способ применения:

1. Промойте лицо и лоб мылом, высушите.
2. Достаньте тубу из картонной коробки и отвинтите колпачок.
3. Используйте шип в верхней части колпачка, чтобы пробить тонкий металлический уплотнитель, закрывающий трубчатое сопло.
4. Аккуратно выдавите 1 см (1/2 дюйма) геля на чистые пальцы.
5. Нанесите гель на пораженный участок кожи тонкой пленкой и осторожно втирайте.
6. Помойте руки и закройте колпачок.

МЕТРОНИДАЗОЛ предназначен только для наружного использования, и если препарат был случайно проглочен, вам следует обратиться за медицинской помощью.

Препарат не предназначен для перорального, офтальмологического или интравагинального применения.

Если Вы забыли принять МЕТРОНИДАЗОЛ, продолжайте лечение, как и раньше, в следующий запланированный утренний или вечерний прием.

Если Вы случайно нанесли слишком много препарата МЕТРОНИДАЗОЛ, удалите избыток препарата теплой водой.

Избегайте контакта с глазами. Если гель случайно попал в глаза, немедленно тщательно промойте глаза водой.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, МЕТРОНИДАЗОЛ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если какой-либо побочный эффект становится более выраженным или если Вы заметили какой-либо побочный эффект, не указанный ниже, сообщите об этом своему лечащему врачу. Если необходимо, удалите гель, промыв участок кожи теплой водой.

Часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$)

- сухость кожи, зуд, шелушение кожи, ощущения дискомфорта (жжение, боль)
- слезотечение (при нанесении геля близко к глазам)
- инфекции верхних дыхательных путей, бронхит, назофарингит, синусит, заложенность носа
- инфекции мочевыводящих путей
- гипертензия
- головная боль
- контактный дерматит

Не часто ($\geq 1/1000$, $< 1/100$)

- боль в спине
- вагинальный микоз
- базальноклеточная карцинома
- неоплазма
- отек лица

Частота неизвестна

- раздражение кожи, преходящее покраснение кожи лица, чувство покалывания или онемения в конечностях, тошнота, металлический привкус.

Сообщения о побочных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на нежелательные реакции, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую производителю (см. ниже) либо через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата МЕТРОНИДАЗОЛ

Храните препарат в недоступном и невидимом для детей месте.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Срок годности: 3 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ препарата МЕТРОНИДАЗОЛ является метронидазол – 180,0 мг (на одну тубу).

ПРОЧИМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ являются карбопол 980 NF, натрия гидроксид, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), пропиленгликоль, вода очищенная.

Внешний вид препарата МЕТРОНИДАЗОЛ и содержимое упаковки

МЕТРОНИДАЗОЛ, 10 мг/г, гель для наружного применения – гель от бесцветного до светло-желтого с зеленоватым или сероватым оттенком цвета.

По 18 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс:(+375 17) 222 78 38, (+375 44) 781 06 00

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: