


7683 - 2020

ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ

(информация для пациента)

по медицинскому применению лекарственного средства

**ЖИВОКОСТА (ОКОПНИКА) МАЗЬ  
(SYMPHYTI UNGUENTUM)**



*Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

**Состав лекарственного средства:**

*действующие вещества:* 1 г мази содержит живокоста настойки ((1:10), экстрагент - этанол 40 %) - 100 мг, витамина Е масляного раствора 98 % - 10 мг;

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий, масло кукурузное рафинированное, глицерин, эмульгатор Т-2, метилпарагидроксибензоат (Е 218), ароматизатор 482.056 (содержит: пропиленгликоль, этанол, лимонную кислоту (Е 330), гуаровую камедь (Е 412), натрия бензоат (Е 211)), вода очищенная.

**Форма выпуска.** Мазь.

**Описание лекарственной формы.** Мазь от кремового до светло-коричневого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах. Код АТХ М02А Х.

**Показания к применению.**

Симптоматическое лечение легких травматических повреждений: растяжений и ушибов.

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повреждение кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках нанесения лекарственного средства.

Период беременности или кормления грудью. Детский возраст до 18 лет.

**Меры предосторожности.**

Только для наружного применения.

Во избежание появления побочных эффектов необходимо предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности. Не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые оболочки, на открытые раны. Не допускать попадания мази в глаза.

Обработка больших поверхностей тела запрещается. Лекарственное средство можно применять только на чистую неповрежденную кожу.

Из-за наличия в составе метилпарагидроксибензоата возможно развитие аллергических реакций (в том числе отсроченных).

Входящий в состав пропиленгликоль может раздражать кожу, натрия бензоат слабо раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки.

После нанесения мази не рекомендуется применять местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций. Пациентам с повышенной чувствительностью не следует принимать горячий душ или ванну до

ГД ГД  
7683 - 2020

или после применения мази. Из-за опасности фотосенсибилизации избегать пребывания на солнце.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, прекратите применение лекарственного средства и обратитесь к врачу.

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием данных применение лекарственного средства во время беременности и лактации не рекомендовано.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.*

Влияние лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами не изучалось.

*Дети.*

В связи с отсутствием адекватных данных применение мази детям до 18 лет не рекомендовано.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились. Не рекомендовано применять одновременно с другими средствами для наружного применения.

**Способ применения и дозировка.**

В зависимости от размера поверхности болезненного участка мазь наносят толстым слоем и тщательно втирают в кожу 2-3 раза в сутки, на ночь можно наносить мазь под повязку. Курс лечения зависит от тяжести заболевания, а также от характера сопутствующей терапии и определяется индивидуально, но не должен превышать 10 дней.

**Передозировка.**

Возможно усиление проявлений побочных реакций. При проявлении симптомов аллергии препарат следует отменить, смыть остатки с кожи. Терапия симптоматическая.

**Побочное действие.**

Возможны реакции гиперчувствительности (в т.ч. зуд, отек, лихорадка).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.

**Срок годности.** 3 года.

*Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!*

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.**

По 40 г в тубе в упаковке № 1.

**Название и адрес производителя.**

ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика».

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишовка, ул. Королева, д. 4.