

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочтайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКИ

HELICHRYSI ARENARIS FOLIA SOVANO

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

от 22. 07 2019 г. № 887

клс № 6 от 26. 06 2019 г.

Регистрационный номер: _____

Форма выпуска

Порошок крупный.

Общая характеристика

Бессмертника песчаного цветки содержат флавоноидные гликозиды, флавоноиды, дубильные вещества, каротиноиды, полисахариды, следы эфирного масла и другие биологически активные вещества.

Описание лекарственной формы

Смесь различной формы кусочков язычковых и трубчатых цветков, цветолож, листочеков обвертки, цветоносов и отдельных язычковых и трубчатых цветков, проходящая сквозь сито с номинальным размером отверстия 2 000 мкм. Цвет обвертки зеленовато-желтый, цветков – зеленовато-желтый или оранжевый. Запах слабый, ароматный.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство оказывает желчегонное действие, обладает диуретическими свойствами, стимулирует секреторную функцию желудка и поджелудочной железы.

Показания к применению

В комплексной терапии хронического некалькулезного холецистита и дискинезии желчевыводящих путей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бессмертнику, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит в стадии обострения. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Порошок крупный. 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и настаивают в течение 15 минут. Фильтр-пакеты отжимают.

Приготовленное водное извлечение принимают внутрь по 200 мл (1 стакан) 1-3 раза в сутки за 15-30 минут до еды. Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать.

Водное извлечение использовать свежеприготовленным.

Кратность приема и длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Особенности применения у пациентов с нарушениями функции почек: информация отсутствует.

Особенности применения у пациентов с нарушениями функции печени: см. разделы «Противопоказания» и «Меры предосторожности».

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При длительном применении лекарственного средства возможно развитие холестаза.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Из-за возможной стимуляции секреции желчи лекарственное средство не следует применять в случае обструкции желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни, холангита, острых воспалительных заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Если во время приема лекарственного средства ~~симптомы сохраняются~~ или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности и лактации

Безопасность применения во время беременности ~~и哺乳~~ не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во ~~время беременности и кормления~~ грудью не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Исследования по оценке влияния применения лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работу с механизмами не проводились.

Применение у детей

Применение у детей до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Передозировка

Длительное применение может привести к развитию застоя желчи. В случае проявления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничены.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия и сроки хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте в оригинальной упаковке при температуре (15-25)⁰C.

Водное извлечение использовать свежеприготовленным.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Упаковка

По 1,2 г в фильтр-пакетах в пачке картонной №20.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040 г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12,
www.padiss.by