


**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ)****Наименование лекарственного препарата**

Виброцил, капли назальные.

Международное непатентованное наименование (МНН)

Отсутствует.



Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш), поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш). Возможно, Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша).
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3 дня Вам следует обратиться к врачу.

**СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
(ЛИСТКА-ВКЛАДЫША):**

1. Что из себя представляет препарат Виброцил, капли назальные, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Виброцил, капли назальные.
3. Применение препарата Виброцил, капли назальные.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Виброцил, капли назальные.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ВИБРОЦИЛ, КАПЛИ
НАЗАЛЬНЫЕ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ****Фармакотерапевтическая группа**

Деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения.

Код АТХ: R01AB01

Виброцил содержит мягкое противоотечное действующее вещество, а также антигистаминное вещество. Виброцил обеспечивает быстрое и длительное снижение отечности слизистой оболочки носа (заложенности носа) и устранение насморка.

Показания к применению

Препарат Виброцил подходит для краткосрочного симптоматического лечения заложенности носа и зуда, например, при простуде, синусите (воспалении придаточных пазух носа), сенной лихорадке, несезонном аллергическом рините (воспалении слизистой оболочки носа, например, вызванном домашней пылью, шерстью животных, плесенью).

По назначению врача Виброцил также может использоваться до или после операции и в качестве вспомогательного лекарственного препарата при лечении острых инфекций среднего уха.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ВИБРОЦИЛ, КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ

Не применяйте препарат Виброцил, капли назальные:

- если у Вас повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- если у Вас хронический ринит, который привел к истончению слизистой оболочки носа;
- если Вы в настоящее время принимаете ингибиторы моноаминоксидазы (ингибиторы MAO – лекарственные препараты от депрессии) или принимали их в течение последних 14 дней;
- если у Вас глаукома (заболевание глаз с повышенным внутренним давлением);
- после трансназальной операции (хирургическое вмешательство в области носа, при котором была обнажена мозговая оболочка).

Не используйте препарат, если что-либо из вышеперечисленного к Вам применимо.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Виброцил, капли назальные, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у Вас:

- высокое артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания;
- гиперфункция щитовидной железы;
- диабет;
- эпилепсия;
- трудности с мочеиспусканием (например, при гипертрофии предстательной железы);
- если Вы принимаете препараты, снижающие артериальное давление (например, бета-блокаторы), препараты, повышающие настроение (ингибиторы MAO, три- или тетрациклические антидепрессанты) или препараты для лечения болезни Паркинсона.

Не следует применять препарат Виброцил более 3 дней подряд. При отсутствии улучшения состояния или ухудшении симптомов в течение 3 дней необходимо обратиться к врачу. При длительном или чрезмерном использовании может возникнуть хроническое воспаление слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит).

Препарат Виброцил может вызывать проблемы со сном, сонливость и тремор у чувствительных людей.

Препарат Виброцил не предназначен для приема внутрь или закапывания в глаза.

Не следует превышать предписанную дозу, особенно у маленьких детей и людей пожилого возраста.

Бензалкония хлорид может вызвать раздражение или отек слизистой оболочки носа, особенно при продолжительном воздействии.

Дети

Виброцил, капли назальные, не предназначен для применения у детей младше 2 лет.

Виброцил следует применять детям от 2 до 12 лет под наблюдением взрослых.

Другие препараты и препарат Виброцил, капли назальные:

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, включая лекарственные препараты, приобретенные без рецепта.

Беременность и грудное вскармливание

Систематические научные исследования не проводились. Фенилэфрин и диметиндена малеат могут проникать в грудное молоко. Поэтому в целях предосторожности не следует применять Виброцил во время беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Данные отсутствуют.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ВИБРОЦИЛ, КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Не следует превышать назначенную дозу и увеличивать частоту применения лекарственного препарата.


Следует использовать самые низкие дозы и минимальную продолжительность применения, необходимую для достижения эффекта.

Взрослым и детям старше 6 лет (под наблюдением взрослых)

По 3-4 капли 3-4 раза в сутки в каждый носовой ход.

Детям от 2 до 6 лет (под наблюдением взрослых)

По 1-2 капли 3-4 раза в сутки в каждый носовой ход.



Применение у детей младше 2 лет

Виброцил, капли назальные, не рекомендуется для применения у детей младше 2 лет.

Способ применения

- Перед применением необходимо тщательно очистить нос (например, высморкаться).
- Следите за тем, чтобы капли не попали в глаза.
- Слегка запрокиньте голову назад. Закапайте капли в каждый носовой ход и оставьте голову откинутой назад на короткое время, чтобы капли могли распределиться.
- Очистите и высушите пипетку, прежде чем привинтить ее обратно к флакону.

Во избежание возможного распространения инфекции не следует передавать флакон препарата Виброцил, капли назальные, другим лицам.

Продолжительность применения

Не применяйте более 3 дней подряд. При отсутствии улучшения состояния в течение 3 дней или ухудшении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Придерживайтесь дозы, указанной в листке-вкладыше или предписанной врачом. Если считаете, что препарат слишком слабый или слишком сильный, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата Виброцил возможны следующие нежелательные реакции – в редких случаях (у 1–10 пользователей из 10 000) может возникать местное и временное жжение или сухость в носу, а также носовое кровотечение.

Если Вы заметили у себя нежелательные реакции, обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это также касается, в частности, нежелательных реакций, не указанных в данном листке-вкладыше.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по медицинскому применению (листке-вкладыше). Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ВИБРОЦИЛ, КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе или картонной пачке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Виброцил, капли назальные, содержит:

Действующими веществами являются фенилэфрина гидрохлорид, диметиндена малеат. Вспомогательными веществами являются: динатрия фосфат безводный, лимонная кислота моногидрат, сорбитол, бензалкония хлорид, масло эфирное лавандовое, не содержащее терпены, вода очищенная.

Внешний вид препарата Виброцил, капли назальные

Прозрачный раствор от бесцветного до бледно-желтого цвета со слабым запахом лаванды.

По 15 мл во флаконе темного стекла с навинчивающейся крышечкой-пипеткой. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

Срок годности

3 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», Российская Федерация / JSC «GlaxoSmithKline Healthcare», Russia.

123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, помещение III, комната 9, эт.6 / 123112, Russia, Moscow, Presnenskaya Naberezhnaya, 10, unit III, room 9, 6 floor.

Производитель

ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ, Швейцария / GSK Consumer Healthcare SARL, Switzerland.

Рю де Леграз, 1260 Нион, Швейцария / Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.

При возникновении нежелательных явлений при приеме препарата, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: oaх70065@gsk.com (для Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии) и EAЕU.PV4customers@gsk.com (для Армении, Беларуси и Кыргызстана). Сообщения о жалобах на качество препарата принимаются по электронной почте UA-CIS.LOC-POC@gsk.com.

Торговые марки принадлежат или используются по лицензии группой компаний GSK.

©2021 группа компаний GSK или их лицензиар.

