


ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ)

Наименование лекарственного препарата

Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптомом.

Международное непатентованное наименование (МНН)
Ксилометазолин.



Перед применением лекарственного препарата **полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш), поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш). Возможно, Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша).
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ (ЛИСТКА-ВКЛАДЫША):

1. Что из себя представляет препарат Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптомом, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптомом.
3. Применение препарата Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптомом.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптомом.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ОТРИВИН, СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ 0,1% С МЕНТОЛОМ И ЭВКАЛИПТОЛОМ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Фармакотерапевтическая группа

Деконгестанты и другие препараты для местного применения. Симпатомиметики.

Код АТХ: R01AA07

Ксилометазолин оказывает действие на рецепторы слизистой оболочки носа. При применении в нос вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа, устраняя, таким образом, отек слизистой оболочки носа и носоглотки. Облегчает носовое дыхание.

Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение 10 часов.

Показания к применению

Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом применяется для лечения любого вида насморка.

Препарат Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом предназначен для применения в области носа, где сужает кровеносные сосуды и тем самым уменьшает отек слизистой оболочки носа и прилегающих участков полости глотки. В результате восстанавливается дыхание через нос.

Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом не следует применять более 7 дней, поскольку длительное применение препарата может привести к хроническому повреждению слизистой оболочки носа (медикаментозному риниту).

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОТРИВИН, СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ 0,1% С МЕНТОЛОМ И ЭВКАЛИПТОЛОМ

Не применяйте препарат Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптолом:

- После проведения трансназальной операции (хирургического вмешательства в области носа, при котором обнажается мозговая оболочка).
- При чрезмерной сухости или хроническом воспалении слизистой оболочки носа (сухой или атрофический ринит).
- При закрытоугольной глаукоме (повышенном внутриглазном давлении).
- При установленной гиперчувствительности к ксилометазолину или любому другому компоненту препарата.

Не используйте препарат, если что-либо из вышеперечисленного к Вам применимо.

Особые указания и меры предосторожности

При применении лекарственного препарата Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом могут возникнуть нарушения сна и зрения или головокружение, которые являются признаками гиперчувствительности. Необходимо обратиться к врачу, если:


- такие симптомы доставляют Вам значительный дискомфорт,
- насморк сохраняется или усиливается, или
- возникают дополнительные жалобы.

В следующих случаях Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом следует применять с осторожностью и только после консультации с врачом или работником аптеки:

- при артериальной гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (например, синдроме удлинённого интервала QT). У пациентов с синдромом удлинённого интервала QT применение лекарственного препарата Отривина спрея с ментолом и эвкалиптолом может привести к развитию тяжелых нарушений сердечного ритма;

- при гипертиреозе;
- при сахарном диабете;
- при увеличении предстательной железы;
- при феохромоцитоме (опухоли надпочечников).

В случае, если Вы принимаете ингибиторы моноаминоксидазы (препараты для лечения депрессии) или принимали их в течение последних 14 дней, применять лекарственный препарат Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом не рекомендуется.



В случае, если Вы принимаете определенные лекарственные препараты для повышения настроения (три- или тетрациклические антидепрессанты) или средства для лечения болезни Паркинсона, применять Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом также не следует.

Лекарственный препарат Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом не рекомендуется применять более 7 дней, поскольку длительное применение препарата может привести к медикаментозному отеку слизистой оболочки носа (медикаментозный или атрофический ринит), который по симптомам очень похож на насморк.

Необходимо следить за тем, чтобы лекарственный препарат не попал в полость рта или глаза.

Не рекомендуется превышать рекомендуемую дозу, особенно у детей и пациентов пожилого возраста.

Вспомогательные вещества

Бензалкония хлорид, входящий в состав препарата, может вызвать раздражение и отек слизистой оболочки полости носа, особенно при длительном применении.

Дети

Препарат Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом не рекомендуется применять у детей младше 12 лет.

Другие препараты и препарат Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптолом:

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, включая лекарственные препараты, приобретенные без рецепта.

Беременность и грудное вскармливание

Лекарственный препарат Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом не следует применять во время беременности. В период грудного вскармливания применение лекарственного препарата допускается только по назначению врача.

Перед применением лекарственных препаратов проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При длительном применении и высоких дозировках ксилометазолина нельзя исключить возможные системные действия с кардиоваскулярными эффектами.


3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОТРИВИН, СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ 0,1% С МЕНТОЛОМ И ЭВКАЛИПТОЛОМ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Следует использовать самые низкие дозы и минимальную продолжительность приема, необходимую для достижения эффекта.

Для взрослых и детей старше 12 лет.



1 впрыскивание в каждый носовой ход. При необходимости повторить. Не следует применять препарат более 3 раз в день.

Дети

Дети младше 12 лет


Препарат Отривин спрей с ментолом и эвкалиптолом не рекомендуется применять у детей младше 12 лет.

Дети старше 12 лет

Режим дозирования такой же, как и для взрослых пациентов.

Способ применения


1.



Не срезайте насадку-распылитель.

Спрей готов к первому нажатию на помпу перед применением.

2.



Перед применением необходимо тщательно очистить нос (например, высморкаться).


Снимите защитный колпачок.

Перед первым применением спрея необходимо несколько раз нажать на распылитель до появления равномерного распыления. Следите за тем, чтобы пары распыляемого спрея не попали в глаза или полость рта.

При последующем использовании спрей готов к применению сразу. Если после многократного нажатия распыление выходит не полностью, например, после временного прекращения применения спрея, следует снова нажать на распылитель 4 раза.

Удерживайте флакон в вертикальном положении, разместив большой палец на дно флакона, а наконечник дозирующего устройства – между двумя пальцами.

3.



Слегка наклоните голову вперед и вставьте наконечник дозирующего устройства в носовой ход.

Нажмите один раз и одновременно легко вдохните носом.

Повторите процедуру для второго носового хода.

После применения протрите и высушите наконечник дозирующего устройства, а затем наденьте защитный колпачок.

Продолжительность применения

Не применяйте более 7 дней подряд. При отсутствии улучшения состояния или ухудшении симптомов в течение 7 дней необходимо обратиться к врачу.

Придерживайтесь дозы, указанной в листке-вкладыше или предписанной врачом. Если считаете, что препарат слишком слабый или слишком сильный, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Если Вы применили препарата Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптом, больше, чем следовало

- следует немедленно обратиться к врачу. Значительная передозировка лекарственного препарата или его непреднамеренное попадание внутрь может привести к отравлению.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение лекарственного препарата Отривин спрей с ментолом и эвкалиптом и немедленно обратитесь к врачу, если у Вас или у Вашего ребенка наблюдается один из следующих симптомов, поскольку это может указывать на развитие аллергической реакции:

- затрудненное дыхание или глотание;
- отек лица, губ, языка и/или горла;
- сильный зуд с красной сыпью и/или бугорками на коже;
- нерегулярный сердечный ритм.

При приеме Отривина спрея с ментолом и эвкалиптом могут возникнуть следующие нежелательные реакции:

Часто (у 1–10 пациентов из 100): сухость и раздражение слизистой оболочки носа, тошнота, головная боль и жжение в месте применения.

Очень редко (менее чем у 1 пациента из 10 000): аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), временное ухудшение зрения, нерегулярное или учащенное сердцебиение, медикаментозный отек слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит).

Если Вы заметили у себя нежелательные реакции, обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это также касается, в частности, нежелательных реакций, не указанных в данном листке-вкладыше.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыше). Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.


5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОТРИВИН, СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ 0,1% С МЕНТОЛОМ И ЭВКАЛИПТОЛОМ

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе или картонной пачке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.



6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптолом, содержит:

1 мл раствора содержит:

Действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид 1 мг.

Вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфат дигидрат, динатрия фосфат додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид (раствор), сорбитол, динатрия эдетат, левоментол (ментол), цинеол (эвкалиптол), макроголглицерол гидроксистеарат (масло касторовое полиэтоксилированное гидрогенизированное), вода очищенная.

Внешний вид препарата Отривин, спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и эвкалиптолом

Прозрачный или опалесцирующий раствор от бесцветного до белого цвета с запахом ментола.

По 10 мл препарата во флаконе из ПВП, снабженном помповым дозирующим устройством с наконечником и с защитным колпачком из полиэтилена. Флакон вместе с инструкцией по применению помещен в пачку из картона.

Срок годности

2,5 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/ производитель

ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ, Швейцария / GSK Consumer Healthcare SARL, Switzerland.

Рю де Летраз, 1260 Нион, Швейцария / Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.

При возникновении нежелательных явлений при приеме препарата, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: oaх70065@gsk.com (для Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии) и EAEU.PV4customers@gsk.com (для Армении, Беларуси и Кыргызстана). Сообщения о жалобах на качество препарата принимаются по электронной почте UA-CIS.LOC-PQC@gsk.com.

*Торговые марки принадлежат или используются по лицензии группой компаний GSK.
©2021 группа компаний GSK или их лицензиар.*

