

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациентов)
по медицинскому применению препарата
ПАЙЛЕКС

Внимательно прочтите эту инструкцию до начала приема препарата.

- Сохраните этот листок. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство продается без рецепта. Тем не менее, для достижения наилучших результатов, вы должны применять его с осторожностью и соблюдая определенные правила.
- Если какой-либо побочный эффект будет вас серьезно беспокоить, или вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, просим сообщить об этом своему врачу или фармацевту.

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ПРЕПАРАТЕ ПАЙЛЕКС МАЗЬ**СОСТАВ****Активные компоненты:****Экстракт жидкий комбинированный**[мимозы стыдливой трава (*Mimosa pudica*) (11:1)эклипты белой трава (*Eclipta alba*) (6,66:1)прутняка китайского надземная часть (*Vitex negundo*) (10:1)календулы лекарственной цветки (*Calendula officinalis*) (5:1)21 03 2016 221
КЛС № 2 ош 02.03.2016

в 1 г мази

130,0 мг *

50 мг

30 мг

30 мг

20 мг]

Порошки:

камфоры 12,25 мг

натрия тетрабората 10,0 мг

цинка оксид 10,0 мг

*-который обработан паром экстракта смеси (в соотношении 1:10 к воде) следующего растительного сырья: азадирахты индийской семена и листья (*Melia azadirachta*), айланта обыкновенного кора (*Ailanthus excelsa*), блюмеи смолоносной смолы (*Blumea balsamifera*), эклипты белой трава (*Eclipta alba*), лука шалота листья (*Allium ascalonicum*), аира обыкновенного корневища (*Acorus calamus*), паслена черного трава (*Solanum nigrum*), мимозы стыдливой трава (*Mimosa pudica*).

Экстрагент – вода.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль (Е 1520), цетостеариловый спирт, желтый вазелин, вазелиновое масло, макрогола цетостеариловый эфир (цетомакрогол 1000), натрия метилпарагидроксибензоат (Е 219), натрия пропилпарагидроксибензоат (Е 217), вода очищенная.

ОПИСАНИЕ

Мазь желтовато - серого цвета, однородной консистенции с темными вкраплениями, с запахом камфоры.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: Прочие средства для лечения геморроя и анальных трещин для наружного применения.

Код АТХ: C05AX

ЧТО ТАКОЕ ПАЙЛЕКС И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**ФАРМАКОДИНАМИКА**

Многокомпонентное аюрведическое средство.

Пайлекс мазь обладает противовоспалительным и вяжущим действием.

**ФАРМАКОКИНЕТИКА**

Данные по фармакокинетике многокомпонентного аюрведического средства Пайлекс в лекарственной форме мази отсутствуют. Активность обусловлена сочетанным действием его компонентов. Поскольку активность препарата нельзя полностью отнести за счет какого-либо одного вещества, фармакокинетические исследования Пайлекс мазь неосуществимы.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДО НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПАЙЛЕКС**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

В составе комплексного лечения геморроя I-II стадии и анальных трещин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

Беременность и кормление грудью.

Массивные кровотечения из геморроидальных узлов, острый тромбоз геморроидальных узлов.

Детский возраст до 18 лет

КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ МАЗЬ ПАЙЛЕКС

Местно, взрослым 2 раза в день (утром и вечером), а так же до и после каждого акта дефекации. Наносят с помощью аппликатора на слизистую оболочку прямой кишки и геморроидальные узлы, включая воспаленные, покрасневшие и уплотненные участки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от степени тяжести патологического процесса. Минимальная продолжительность курса лечения составляет 14-28 дней. При необходимости курс терапии может быть продлен после консультации с врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции.

После нанесения мази может возникнуть слабое жжение, пощипывание вокруг ануса продолжительностью 10-15 минут. Возможно развитие местных реакций: раздражение кожи и слизистой, контактный дерматит. В случае возникновения перечисленных или иных реакций следует обратиться к врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки препарата не описаны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Возможно кратковременное ощущение жжения в месте нанесения, проходящее самостоятельно через несколько минут.

Терапевтическое действие препарата Пайлекс развивается постепенно. Однако, если при применении средства вы не почувствуете улучшения, либо симптомы будут ухудшаться, обратитесь к врачу. Также следует обратиться к врачу при острых болях и кровотечении.

Пайлекс мазь содержит метилпарагидроксибензоат натрия и пропилпарагидроксибензоат натрия, которые могут вызвать аллергические реакции (возможно развитие отсроченных реакций).

Пайлекс мазь содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Пайлекс мазь содержит также пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

Беременность и кормление грудью

Лекарственное средство Пайлекс мазь не применяется у беременных и в период кормления грудью, поскольку отсутствует клинический опыт и не исследован профиль безопасности.

Проконсультируйтесь с врачом перед приемом любого лекарственного средства, если вы беременны или кормите ребенка грудью.

Применение у детей

Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Пайлекс мазь в детском возрасте не установлены, поэтому не рекомендовано назначать его детям и подросткам до 18 лет.

Применение у пожилых людей и больных с нарушенной функцией почек или печени

Данных нет.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Несовместимость с другими лекарственными средствами не выявлена, тем не менее, не рекомендуется одновременное использование других противогеморроидальных средств для местного применения.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

Препарат Пайлекс не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами, использованию механизмов и выполнения других работ, требующих внимания и хорошей координации.

УПАКОВКА ПРЕПАРАТА

По 30,0 г в тубы из ламинированной алюминиевой фольги. Каждая туба в комплекте с насадкой-аппликатором и листком-вкладышем упакована в картонную пачку.

КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ МАЗЬ ПАЙЛЕКС

Хранить при температуре от + 10 до + 30 °C в защищенном от влаги месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности указан на упаковке.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается без рецепта врача.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

“Хималайя Драг Ко”, Макали, Бангалор 562 162, Индия.