



Листок-вкладыш – информация для потребителя
ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД, мазь для наружного применения 50 мг/г
Действующее вещество: декспантенол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД и для чего её применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД
3. Применение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД
и для чего его применяют**

Препарат ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД, мазь для наружного применения, содержит действующее вещество декспантенол. Декспантенол быстро проникает в клетки и превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль в клеточном обмене веществ и необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек.

ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД применяется для:

- активизации процессов заживления при мелких повреждениях кожи: легких ожогах, ссадинах; при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения; при хронических язвах, пролежнях, анальных трещинах, пересадке кожи; при лечении кортикостероидами;
- ухода за сухой и потрескавшейся кожей;
- профилактики и лечения опрелостей у грудных детей;
- регулярного ухода за молочными железами в период кормления грудью, лечение болезненности или трещин сосков.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД**

Не применяйте ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД, если:

- у вас аллергия на декспантенол или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

В случае проявления аллергической реакции необходимо прекратить применение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД.

Следует избегать попадания мази в глаза.

Другие препараты и препарат ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Другие взаимодействия

В применении мази в области гениталий или ануса следует учитывать, что вспомогательные вещества, содержащиеся в мази, приводят к снижению прочности и разрывам латексных презервативов, тем самым снижая их безопасность.

Беременность и кормление грудью

ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Вожждение автотранспорта и управление механизмами

Влияние на способность управления автотранспортом или работу с другими механизмами не выявлено.

Важная информация о некоторых вспомогательных веществах

Мазь ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД содержит ланолин, стеариловый и цетиловый спирты, которые могут вызвать раздражение кожи (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Для наружного применения у взрослых и детей.

Мазь наносят на пораженный участок кожи один или более раз в день по необходимости.

При уходе за грудным ребенком мазь следует наносить при каждой смене подгузника.

При уходе за молочными железами во время грудного вскармливания: мазь можно наносить на соски после каждого кормления.

Длительность лечения зависит от характера и течения заболевания.

Если вы считаете, что действие лекарственного препарата слишком слабое или слишком сильное, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата возможно развитие аллергических реакций, в том числе кожных – контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема (покраснение), экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, пузырьковая сыпь.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, не указанные в данном листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не применяйте препарат по истечении срока годности.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Одна туба 30 г содержит действующее вещество: декспантенол – 1500 мг.

Вспомогательными веществами являются ланолин (E913), парафин жидкий, парафин мягкий белый, протегин ХN, масло миндальное очищенное, воск пчелиный белый (E901), цетиловый спирт, стеариловый спирт, вода очищенная.

Внешний вид препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД и содержимое упаковки

ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД, мазь для наружного применения 50 мг/г, – однородная мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом ланолина.

По 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: