

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ДЛЯ ПАЦИЕНТА: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Пирантел, 250 мг, таблетки *Пирантел*

Следует ознакомиться с содержанием листка-вкладыша перед применением лекарственного средства.

- Следует сохранить этот листок-вкладыш, чтобы в случае необходимости иметь возможность снова его прочесть.
- Следует обратиться к врачу или фармацевту, когда необходимы консультация или дополнительная информация.
- Данное лекарственное средство назначено строго определенному лицу, и не следует его передавать другим, так как оно может им навредить, даже если симптомы их заболевания такие же.
- В случае усиления какого-либо нежелательного эффекта или появления других неблагоприятных побочных реакций, не перечисленных в данном листке-вкладыше, необходимо поставить в известность врача.

Содержание листка-вкладыша:

1. Чем является лекарственное средство Пирантел, и с какой целью оно применяется?
2. Информация, с которой необходимо ознакомиться перед применением лекарственного средства Пирантел
3. Как принимать лекарственное средство Пирантел
4. Возможные побочные действия
5. Условия хранения лекарственного средства Пирантел
6. Дополнительная информация

1. ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПИРАНТЕЛ И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ОНО ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Пирантел является противогельминтным лекарственным средством, действующим на нематоды, находящиеся в желудочно-кишечном тракте.

Применяется при:

- Аскаридозе, вызванном *Ascaris lumbricoides*
- Энтеробиозе, вызванном *Enterobius vermicularis*
- Инвазии анкилостомой *Ancylostoma duodenale* и *Necator americanus*.

2. ИНФОРМАЦИЯ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПИРАНТЕЛ


Когда нельзя применять лекарственное средство Пирантел

- Если у пациента имеется аллергия (повышенная чувствительность) к пирантелу или какому-либо другому составляющему лекарственного средства Пирантел.
- Если у пациента была диагностирована миастения (в период лечения).

Когда следует соблюдать особую осторожность, принимая лекарственное средство Пирантел

Следует сообщить врачу, если:

- у пациента диагностирована печеночная недостаточность;
- у пациента диагностирована анемия;
- пациент истощен (недостаточно питается).



Особые указания при приеме лекарственного средства Пирантел

При лечении нет необходимости применять слабительные средства.

Для предотвращения повторного заражения рекомендовано четкое соблюдение правил личной гигиены: проводить ежедневный туалет перианальной области, регулярно менять нижнее белье, чистить ногти несколько раз в день. Детям необходимо коротко обрезать ногти, предотвращать расчесывание. При энтеробиозе рекомендуется проводить одновременное лечение всех членов семьи, так как заболевание может протекать бессимптомно. Через 14 дней после завершения лечения препаратом рекомендуется провести контрольные паразитологические исследования.

Применение лекарственного средства Пирантел с другими лекарственными средствами

Следует сообщить врачу обо всех лекарственных средствах, которые Вы принимали в последнее время, включая те, которые отпускаются без рецепта.

Следует сообщить врачу о применении:

- пиперазина;
- теофиллина.

Применение лекарственного средства Пирантел с едой и напитками

Лекарственное средство следует принимать во время или после еды.

Беременность и кормление грудью

Перед применением любого лекарственного средства следует посоветоваться с врачом. Лекарственное средство Пирантел может применяться в период беременности только в том случае, если, по мнению врача, это является абсолютно необходимым.

Не рекомендуется применять лекарственное средство Пирантел в период лактации. Если лечение пирантелом крайне необходимо, кормление грудью следует прекратить.

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов


Учитывая возможные побочные эффекты со стороны нервной системы (головокружение, головная боль, др.), во время применения лекарственного средства необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПИРАНТЕЛ

Лекарственное средство Пирантел следует всегда принимать в соответствии с рекомендациями врача. В случае сомнений необходимо еще раз посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Препарат в форме таблеток предназначен для взрослых и детей старше 6 лет. Для детей младше 6 лет препарат существует в форме суспензии.

Лекарственное средство принимают внутрь, запивая достаточным количеством воды, **НЕ АНО** обязательно натощак. Перед проглатыванием таблетку следует **тщательно разжевать**.



Острицы и аскариды

При лечении энтеробиоза и аскаридоза препарат назначают однократно в рекомендуемой дозе. Обычная доза составляет 10 мг – 12 мг /кг массы тела в один прием, то есть:

- Дети старше 6 лет: 250 мг (1 таблетка) на 20 кг массы тела в один прием.
- Взрослые с массой тела менее 75 кг: 750 мг (3 таблетки) в один прием.
- Взрослые с массой тела более 75 кг: 1 г (4 таблетки) в один прием.

Во время лечения энтеробиоза необходимо строго соблюдать правила гигиены. Для профилактики повторного заражения может быть рекомендован повторный прием препарата через 3 недели.

Анкилостомы

В зонах эндемии, в случае заражения *Necator americanus* или в случае тяжелого заражения *Ancylostoma duodenale* дозировка составляет 20 мг/ кг массы тела в день (за один или два приема) в течение 2-3 дней, то есть:

- Дети старше 6 лет: 250 мг (1 таблетка) на 10 кг массы тела в сутки.
- Взрослые с массой тела менее 75 кг: 1,5 г (6 таблеток) в день.
- Взрослые с массой тела более 75 кг: 2 г (8 таблеток) в день.

В случае легко протекающей инвазии *Ancylostoma duodenale* (обычно имеет место за пределами зон эндемии) может быть достаточно однократного приема препарата в дозе 10 мг/кг массы тела.

Прием большей дозы лекарственного средства Пирантел, чем рекомендуемая

В случае интоксикации следует безотлагательно обратиться к врачу.

После передозировки лекарственным средством могут развиваться следующие симптомы: нарушения зрения, дезориентация, головокружение, обморок или чувство головокружения при подъеме из положения лежа или сидя, повышенное потоотделение, ранее не наблюдавшееся чувство усталости или слабости, нерегулярный пульс, судороги, тремор и мышечная слабость, проблемы с дыханием, потеря сознания.

Пропуск приема лекарственного средства Пирантел

В случае пропуска приема дозы лекарственного средства следует принять ее так быстро, как это возможно. Если наступило время приема очередной дозы лекарственного средства, не следует принимать пропущенную дозу. Не следует принимать двойную дозу с целью восполнения пропущенной дозы.

При наличии сомнений, связанных с применением лекарственного средства, необходимо обратиться к врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как каждое лекарственное средство, Пирантел может вызывать побочные действия, хотя возникают они не у каждого.

После применения лекарственного средства нежелательные эффекты возникают редко и проходят после прерывания лечения.

Наблюдались следующие нежелательные эффекты:

Редко (возникают реже, чем у 1 на 1000 пациентов)

Производитель и Владелец регистрационного удостоверения
Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО
ул. Пельплиньска 19
83-200 Старогард Гданьски
Польша

СОГЛАСОВАНО
НАЦИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ГИГИЕНЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь