

**Листок-вкладыш: информация для потребителя**  
**Перметрин ФТ, раствор для наружного применения 5 мг/мл**  
перметрин

**Перед началом применения лекарственного средства полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Лекарственное средство назначено именно Вам/Вашему ребенку. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с симптомами заболевания у Вас/Вашего ребенка.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на неперечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что представляет собой лекарственное средство Перметрин ФТ и для чего его применяют
2. О чём следует знать перед применением лекарственного средства Перметрин ФТ
3. Как применять лекарственного средства Перметрин ФТ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение лекарственного средства Перметрин ФТ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1 Что представляет собой лекарственное средство Перметрин ФТ и для чего его применяют**

Лекарственное средство Перметрин ФТ содержит действующее вещество перметрин. Перметрин относится к группе пиретринов и уничтожает головную вошь. Перметрин оказывает действие на все стадии развития вшей (гниды, личинки и взрослые вши), проникая через наружные покровы насекомых и приводя к нарушению нервной регуляции и в итоге к гибели насекомых.

Перметрин ФТ предназначен для применения у взрослых и у детей в возрасте 2 месяца и старше.

**Показания к применению**

Лечение заболеваний, вызываемых головной вошью *pediculus humanus capititis*.

**2 О чём следует знать перед применением лекарственного средства Перметрин ФТ**  
Сообщите врачу обо всех проблемах со здоровьем и аллергиях, которые были или есть у Вас или у Вашего ребенка.

**Противопоказания**

*Не применяйте лекарственное средство Перметрин ФТ, если:*

- у Вас или у Вашего ребенка имеется повышенная чувствительность к перметрину или к любому из вспомогательных компонентов лекарственного средства Перметрин ФТ (см. раздел 6);
- у Вас или у Вашего ребенка повышенная чувствительность к пиретроидам или пиретрину;
- возраст Вашего ребенка не более 2 месяцев.

**Особые указания и меры предосторожности при применении**

Перед применением лекарственного средства Перметрин ФТ следует проконсультироваться с врачом.

Лекарственное средство Перметрин ФТ предназначено для местного применения. *Не допускается принимать лекарственное средство внутрь либо вводить его иными другими путями, не предусмотренными данным листком-вкладышем* (см. раздел 3.3).

Лечение следует проводить только в случае, когда были обнаружены яйца вшей и/или живые вши. В таких случаях также необходимо проведение обработки лиц, контактировавших с человеком, у которого был установлен педикулез, даже при отсутствии признаков инфицирования.

Обработку проводят в хорошо проветриваемом помещении. При нанесении лекарственного средства можно использовать перчатки.

Медицинскому персоналу, часто работающему с лекарственными средствами, содержащими перметрин, следует использовать перчатки, чтобы избежать раздражающего действия на кожу рук.

*После использования лекарственного средства следует тщательно вымыть руки с мылом.*

Необходимо избегать попадания лекарственного средства Перметрин ФТ на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости, наружных половых органов. Перметрин не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки, однако этанол, входящий в состав лекарственного средства, оказывает раздражающее действие. *В случае попадания перметрина на слизистые оболочки необходимо их тщательно промыть проточной водой.*

Следует использовать лекарственное средство с осторожностью при наличии открытых ран или обширных поражений кожи (травмы или ожоги).

Перметрин может ухудшить течение астмы и экземы.

Поскольку в составе лекарственного средства содержится этанол 96%, то возможно воспламенение лекарственного средства при использовании вблизи открытого огня.

При аллергии на хризантемы и прочие растения из того же семейства применение лекарственного средства возможно только по строгим показаниям.

Влияние перметрина на окрашенные волосы и волосы с химической завивкой не было изучено. Однако, поступали редкие сообщения о нежелательных эффектах лекарственных средств на основе перметрина на окрашенные волосы или волосы с химической завивкой. Поскольку опыт применения перметрина в таких случаях ограничен, следует нанести лекарственное средство вначале на небольшой участок волос, прежде чем приступить к нанесению лекарственного средства на кожу головы и волосы.

При сохранении признаков заболевания (даже несмотря на повторное нанесение лекарственного средства; см. раздел 3.3) в течение 14-20 дней следует рассмотреть возможность применения альтернативных лекарственных средств.

#### *Дети*

Перметрин ФТ не должен применяться у детей младше 2 месяцев.

Лечение педикулеза у детей от 2 месяцев до 3 лет включительно должно проводиться под наблюдением медицинского персонала, поскольку опыт применения перметрина у данной возрастной категории ограничен (см. раздел 3.2).

#### *Применение лекарственного средства Перметрин ФТ совместно с другими лекарственными средствами*

*Если Вы применяете, недавно применяли или планируете применять какие-либо лекарства с местным или системным действием, включая лекарства, отпускаемые без рецепта, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту/провизору перед использованием лекарственного средства Перметрин ФТ.*

Исследования взаимодействия перметрина с другими лекарственными средствами не проводились.

*Применение лекарственного средства Перметрин ФТ при беременности и лактации*  
*Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, если Вы не исключаете у себя наличие беременности на данный момент или если Вы планируете беременность, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед началом применения лекарственного средства.*

*Если на 7-10 день после первого нанесения лекарственного средства Перметрин ФТ сохранились признаки педикулеза и одновременно Вы предполагаете или установите у себя беременность, проконсультируйтесь с врачом насчет возможности повторного нанесения данного лекарственного средства.*

#### **Фертильность**

Нет данных о влиянии перметрина на фертильность при его наружном применении у людей.

Доклинические исследования на животных не выявили отрицательного влияния на фертильность при наружном применении перметрина.

#### **Беременность**

Опыт применения перметрина у беременных женщин (около 900 случаев) не подтверждает повышение риска развития пороков у плода, также не выявлено доказательств токсичности перметрина в отношении плода и новорожденного.

Доклинические исследования на животных не выявили явлений репродуктивной токсичности.

В целях безопасности следует избегать применения перметрина во время первого триместра беременности. Использование лекарственного средства Перметрин ФТ во время второго и третьего триместров беременности возможно только при неэффективности других методов лечения педикулеза и после тщательной оценки соотношения польза/риска.

#### **Лактация**

В случае необходимости применения перметрина в период кормления грудью в целях безопасности после нанесения лекарственного средства кормящие женщины должны прервать грудное вскармливание на 3 дня, поскольку в исследованиях на животных установлено, что некоторое количество перметрина выделяется с грудным молоком.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Перметрин не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать потенциально опасные механизмы.

### **3 Применение лекарственного средства Перметрин ФТ**

*Только для наружного применения! Лекарственное средство нельзя принимать внутрь!  
Применяйте лекарственное средство в полном соответствии с рекомендациями врача или фармацевта/привозора. При появлении каких-либо сомнений посоветуйтесь с врачом или фармацевтом/привозором.*

*После использования лекарственного средства необходимо тщательно вымыть руки с мылом.*

#### **3.1 Доза**

В большинстве случаев достаточно однократного применения. Для достижения эффекта волосы должны быть хорошо пропитаны раствором.

Для детей от 4 лет и для взрослых необходимое количество раствора составляет:

- для коротких волос – приблизительно 25 мл;
- для длинных волос – около 50 мл;
- для очень длинных и/или для очень густых волос – до 150 мл.

Для детей от 2 месяцев до 3 лет включительно (независимо от длины и густоты волос) максимальное количество раствора составляет 25 мл.

#### **3.2 Дети**

Безопасность и эффективность перметрина у детей в первые 2 месяца жизни не установлены.

У детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет включительно опыт применения перметрина ограничен, максимальная доза составляет 25 мл раствора лекарственного средства. Лечение должно проходить с осторожностью под наблюдением медицинского персонала.

#### **3.3 Способ применения**



Перед применением лекарственного средства Перметрин ФТ волосы следует вымыть шампунем и высушить полотенцем. *Лекарственное средство Перметрин ФТ следует применять в неразбавленном виде. Не следует использовать одновременно с поверхностно-активными веществами, особенно щелочными.* Слегка влажные волосы равномерно смачивают раствором с помощью ватного тампона, особенно хорошо втирая лекарственное средство в корни волос. Особое внимание следует уделить участкам волосяного покрова головы за ушами и на задней поверхности шеи.

*После использования лекарственного средства необходимо тщательно вымыть руки с мылом.*

Необходимо оставить лекарственное средство на 30-45 минут, после чего смыть раствор с кожи головы и волос теплой проточной водой. Волосы расчесать гребнем для удаления гнид и погибших вшей.

Для обеспечения максимального эффекта волосы не следует мыть шампунем в течение первых 3-х дней после обработки раствором перметрина, однако допускается промывание волос водой. В результате активный ингредиент остается на волосах и проявляет свой эффект в отношении гнид и вшей даже после обработки. Поскольку заболевание легко передается от человека к человеку, рекомендуется осмотр всех контактных лиц в семьях или в детских коллективах.

При правильном использовании эффективность лечения перметрином достигается, как правило, уже с первой обработки (примерно в 75% случаев). В случае повторного проявления педикулеза рекомендуется повторить обработку через 7-10 дней. После повторного применения результат достигается в 95-100% случаев.

*Если через 14-20 дней все еще можно обнаружить живых вшей, несмотря на повторное проведение обработки лекарственным средством необходимо обратиться за консультацией к врачу.*

Профилактическая обработка перметрином не может предотвратить возникновение педикулеза у человека при отсутствии признаков заболевания. Вместе с этим в ситуации эпидемии целесообразно одновременное лечение инфицированного человека и обработка всех членов коллектива (класс школы, группа детского сада) даже при отсутствии симптомов заражения, так как вши и гниды, а также признаки педикулеза у контактных лиц могут обнаружиться не сразу.

Также рекомендуется проводить одновременную обработку (например, стирка) предметов одежды и постельного белья всех совместно проживающих лиц во избежание повторного заражения.

*Не следует применять лекарственное средство Перметрин ФТ более 2 раз, поскольку это может привести к развитию устойчивости к перметрину у вшей.*

**При частом нанесении лекарственного средства на волосы у корней**, что неразрывно связано с попаданием лекарственного средства на кожу, в течение короткого периода времени (например, в течение дня) наиболее вероятно возникновение реакций гиперчувствительности со стороны кожи и в очень редких случаях симптомов передозировки, схожих с таковыми, которые наблюдаются при его попадании внутрь.

**Лекарственное средство Перметрин ФТ не допустимо применять на всей поверхности тела**, поскольку может возникнуть интоксикация из-за всасывания вспомогательного вещества изопропилового спирта.

**При случайном или преднамеренном проглатывании лекарственного средства следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.** При проглатывании лекарственного средства могут развиться симптомы, связанные с воздействием спирта этилового (96%) и изопропилового спирта (эйфория; атаксия; спутанность сознания с дальнейшим усугублением, что также может осложниться падением артериального давления), и симптомы, связанные с воздействием самого перметрина (тошнота, головная боль, головокружение, усталость; также сообщалось о возникновении серьезных реакций,

таких как ощущение покалывания, онемения в конечностях, повышенная возбудимость и судороги). Может понадобиться проведение промывания желудка в максимально короткие сроки после попадания лекарственного средства внутрь (применение активированного угля не рекомендовано), а также наблюдение за состоянием пациента. В тяжелых случаях отравления может понадобиться проведение гемодиализа.

#### **4 Возможные нежелательные реакции**

Подобно другим лекарственным средствам, Перметрин ФТ может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

При применении лекарственного средства могут возникнуть реакции повышенной чувствительности немедленного типа. Данные реакции возникают внезапно, в самое ближайшее время (несколько секунд, минут) после применения лекарственного средства и могут быстро нарастать. Могут появиться:

- зудящая красная сыпь, сопровождающаяся воспалением кожи (крапивница);
- иные разновидности сыпи.

Может развиться один симптом или одновременно оба указанных симптома.

*Следует быть настороженным относительно возможного возникновения данных симптомов либо других симптомов, которые, по Вашему мнению, могут указывать на развитие аллергической реакции. При возникновении подобных реакций необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться за медицинской помощью.*

Нежелательные реакции, возникающие при применении перметрина, распределены по частоте встречаемости:

*Редко (могут возникать у более чем 1 человека из 1000):* головная боль, раздражение кожи (покраснение), зуд, ощущение жжения или покалывания.

*Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):* одышка ( затруднение дыхания), тошнота, рвота, аллергические кожные реакции, боль в спине, артрит, миалгия, нарушение функции почек, включая почечную недостаточность у пациентов с предрасположенностью.

*Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):* парестезия, головокружение, контактный дерматит, крапивница, выпадение волос, шелушение кожи (перхоть).

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного средства с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения польза/риск лекарственного средства. В случае возникновения нежелательных реакций, перечисленных в данном листке-вкладыше, а также не упомянутых в нем, или в случае неэффективности лекарственного средства необходимо, в первую очередь, незамедлительно сообщить об этом лечащему врачу. Также можно позвонить по номеру телефона компании-производителя лекарственного средства, указанному в разделе «Информация о производителе» либо сообщить о нежелательной реакции/неэффективности в Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (<https://www.rceth.by/>).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного средства.

#### **5 Хранение лекарственного средства Перметрин ФТ**

Хранить в недоступном для детей месте.


Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Срок годности: 2 года. Не использовать лекарственное средство по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **6 Содержимое упаковки и прочие сведения**

##### **Состав**

Действующее вещество: перметрин 5 мг/1 мл.



*Вспомогательные вещества:* этиловый спирт 96%, изопропиловый спирт, макроголглицерина гидроксистеарат, вода очищенная.

***Внешний вид лекарственного средства Перметрин ФТ и содержимое упаковки***

Прозрачный или слегка опалесцирующий, желтоватый или коричневато-желтоватый раствор.

По 50 мл во флаконах пластмассовых, укупоренных колпачками полимерными винтовыми. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем для потребителей помещают в пачку из картона.

***Условия отпуска из аптек***

Без рецепта врача.

**7 Производитель**

ООО «Фармтехнология», 220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Тел./факс: (017) 309 44 88. E-mail: ft@ft.by.

