

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
ПУСТЫРНИКА ТРАВА
LEONURI HERBA

Регистрационный номер: _____

Общая характеристика

Смесь кусочков стеблей, листьев и соцветий, проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 5600 мкм. Цвет серовато-зеленый, коричневатозеленый с возможным присутствием белых и грязно-розовых вкраплений. Запах слабый.

Пустырника трава содержит флавоноиды (рутин, кверцетин, квинквелозид), алкалоид стахидрин, сапонины, горькие гликозиды, дубильные вещества, эфирное масло.

Форма выпуска

Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие снотворные и седативные средства.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство растительного происхождения. Лекарственные средства, содержащие траву пустырника, оказывают седативное, гипотензивное и кардиотоническое действие.

Показания к применению

Применяют в качестве успокаивающего средства при функциональных расстройствах нервной системы (неврастения); в комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность, брадикардия, артериальная гипотензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит (фаза обострения), беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы

Около 8 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Настаивают не менее 45 мин при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/3 стакана 1-3 раза в день за 1 час до еды.

Перед употреблением настоев рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Особенности применения у пациентов с нарушениями функции печени и/или почек: информация отсутствует.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, развитие утомляемости, сонливости, головокружения, снижение артериального давления.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка


При передозировке возможно усиление симптомов побочного действия (утомляемость, сонливость, головокружение, снижение артериального давления).

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Усиливает эффекты снотворных и седативных средств.



Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Применение при беременности и лактации. Применение во время беременности противопоказано, трава пустырника способна повышать тонус матки. Применение во время кормления грудью не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Во время приема травы пустырника возможно снижение скорости психомоторных реакций. В период лечения рекомендовано отказаться от вождения автотранспорта и работы с движущимися механизмами.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных. У детей в возрасте 12-18 лет применять только после консультации врача.

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой - не более 2-х суток при температуре (8-15) °С.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 50 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.