

1918 Б-2019

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ:  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**Рациум**

**Международное непатентованное название:** -  
 Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.)  
 Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.)  
 Мята перечная (*Mentha piperita* L.)  
 Капсулы

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от 04.10.2028 № 1334

**Внимательно прочтайте весь листок-вкладыш, поскольку он содержит важную для Вас информацию.**

Данный препарат отпускается без рецепта. Однако, для получения оптимального результата принимайте его, точно соблюдая инструкции.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вы захотите прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут вопросы, посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.
- Если после 14 дней симптомы сохраняются или обостряются, обратитесь к врачу.
- При возникновении серьезных или новых, не описанных в данном листке-вкладыше, побочных эффектов, пожалуйста, обратитесь к врачу или фармацевту.

**Содержание:**

1. Что такое Рациум и для чего его применяют
2. Что необходимо знать перед приемом Рациума
3. Как принимать Рациум
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Условия хранения.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### 1. ЧТО ТАКОЕ РАЦИУМ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Рациум представляет собой растительный препарат с успокаивающим, снотворным, спазмолитическим действием.

Тонкоизмельченный порошок корневищ с корнями валерианы оказывает успокаивающее действие, а также улучшает качество и продолжительность сна.

Порошок травы мелиссы оказывает успокаивающее и спазмолитическое, порошок листьев мяты перечной - спазмолитическое, умеренное успокаивающее действие.

*Rациум применяется:*

В комплексной терапии нетяжелых функциональных нарушений центральной нервной системы (неврастения и нарушения сна).

Применение лекарственного средства основано исключительно на опыте традиционного многолетнего использования.

### 2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ РАЦИУМА

**Не принимайте препарат Рациум, если у Вас:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст (до 12 лет);

- артериальная гипотензия.

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (изжогой) следует избегать приема лекарственных средств, содержащих мяту, из-за возможного усиления изжоги.

Пациентам с желчнокаменной болезнью, другими заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей не следует принимать листья мяты перечной без наблюдения врача.

В связи с отсутствием данных о безопасности и эффективности прием Рациума детьми в возрасте до 12 лет не рекомендован.

#### **Rациум содержит лактозу**

Капсулы препарата Рациум содержат лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, синдромом недостаточности лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать препарат.

*При наличии у Вас одного из перечисленных выше заболеваний или состояний перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.*

#### **Другие препараты и препарат Рациум**

Ваш лечащий врач должен быть информирован обо всех лекарствах, которые Вы принимаете. Перед началом приема какого-либо лекарственного средства во время лечения лекарственным средством Рациум проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Информация о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничена. Возможно усиление действия гипотензивных, обезболивающих и угнетающих функции центральной нервной системы препаратов. Перед приемом других лекарственных средств пациент должен обратиться к врачу.

Клинически значимые взаимодействия с веществами, которые метаболизируются с помощью CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 и CYP 2E1 не наблюдались.

Одновременный прием Рациума с синтетическими седативными средствами (например, бензодиазепинами) не рекомендуется и допускается только под наблюдением врача.

#### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**


*Если вы беременны, подозреваете или планируете беременность, либо кормите грудью, перед приемом данного лекарственного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.*

Безопасность применения во время беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием данных применять во время беременности и кормления грудью не рекомендуется.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Прием Рациума может ухудшить способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Во время лечения не рекомендуется управлять автомобилем и работать с механизмами.

#### **3. КАК ПРИНИМАТЬ РАЦИУМ**



#### **Режим дозирования**

##### **Взрослым и детям старше 12 лет**

При повышенной нервной возбудимости, раздражительности: по 1-3 капсулы 2-3 раза в день.

При бессоннице: по 1-3 капсулы за 1 час перед сном.

Действие препарата развивается постепенно. Для достижения оптимального эффекта рекомендуется прием лекарственного средства в течение не менее 14 дней. После

1918 Б-2019

прекращения лечения не происходит развитие симптомов зависимости или синдрома отмены.

Если симптомы сохраняются на фоне приема лекарственного средства в течение 14 дней или происходит ухудшение состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Дозирование в особых случаях**

#### **Дети**

Прием Рациума не рекомендован детям в возрасте до 12 лет в связи с отсутствием данных о безопасности и эффективности.

#### **Способ применения**

Капсулы принимают внутрь во время еды, не разжевывая, запивая полным стаканом кипяченой воды комнатной температуры.

#### **Если Вы приняли препарата Рациум больше, чем следовало**

Передозировка Рациума может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, дрожание рук, расширение зрачков, которые могут исчезнуть самостоятельно в течение 24 часов.

**При появлении симптомов передозировки рекомендуется немедленно обратиться к врачу для оказания своевременной медицинской помощи!**

#### **Если вы забыли принять Рациум**

Если Вы забыли принять капсулу, примите ее как можно скорее. Если уже подошло время приема следующей дозы, примите ее согласно обычной схеме.

**Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы восполнить забытую дозу.**

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по использованию данного лекарственного препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

## **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

*Как и все лекарственные препараты, Рациум может вызывать побочные эффекты, которые, однако, развиваются не у всех.*

Частота неизвестна (не может быть оценена на основании доступных данных):

- тошнота;
- боли спастического характера в брюшной полости.

Возможно усиление симптомов гастроэзофагеального рефлюкса (изжоги).

Возможно развитие аллергических реакций.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**


Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в листке-вкладыше.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## **5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить при температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Вы не должны использовать настоящий лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.



1918 Б-2019

## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

**Что содержит Рациум****Одна капсула содержит:**

- - 100 мг порошка корневищ с корнями валерианы (*Valeriana officinalis L.*);
- - 50 мг порошка травы мелиссы (*Melissa officinalis L.*);
- - 50 мг порошка листьев мяты перечной (*Menta piperita L.*).

*Вспомогательные вещества:* лактоза безводная, повидон, магния стеарат, картофельный крахмал.

*Состав оболочки капсулы:* желатин, краситель бриллиантовый голубой (E133), титана диоксид (E171).

**Как Рациум выглядит и содержание его упаковки**

Капсулы твердые желатиновые, номер 0, корпус от белого до серовато или желтовато-коричневатого цвета, крышечка - голубого цвета.

По 21 капсуле в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке картонной.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускается без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ»

220141, г. Минск, ул. академика В.Ф. Купревича, д. 5, корп.3, Республика Беларусь,  
тел./факс 8(017) 268-63-64

[info@academpharm.by](mailto:info@academpharm.by)

Настоящий листок-вкладыш последний раз редактировался в августе 2022 г.

