

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

**Листок-вкладыш**  
(информация для пациента)

**РОМАШКИ ЦВЕТКИ**

MATRICARIAE FLOS

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от «19» 11.2019 № 1375

**МНН.** Отсутствует.

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**Общая характеристика.** Ромашки цветки содержат эфирное масло, флавоноиды, кумарины, органические кислоты, полисахариды, горечи и другие биологически активные вещества.

**Состав.** Ромашки цветки, цельное сырье.

**Форма выпуска.** Цельное сырье 50 г в пачке.

**Описание.** Цельные или частично осыпавшиеся цветочные корзинки полушировидной или конической формы, без цветоносов или с их остатками не длиннее 3 см. Корзинка состоит из краевых язычковых пестичных и срединных обоеполых трубчатых цветков. Цветоложе голое, мелкоямчатое, полое, в начале цветения полушировидное, к концу – коническое. Обвертка корзинки черепитчатая, многорядная, состоящая из многочисленных продолговатых, с тупыми верхушками и широкими пленчатыми краями листочков. Размер корзинки (без язычковых цветков) 4–8 мм в поперечнике. Цвет язычковых цветков белый, трубчатых – желтый, обвертки – желтовато-зеленый. Запах сильный, ароматный.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

**Фармакологические свойства.** Средство растительного происхождения. По результатам экспериментальных исследований оказывает противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое действие, способствует заживлению ран.

**Показания к применению.** Внутрь: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения нетяжелых функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (метеоризм, легкие болевые ощущения спастического характера).

**Местно:** для полосканий в комплексной терапии нетяжелых воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

**Наружно:** в составе комплексной терапии для симптоматического лечения воспалительных заболеваний кожи и воспалительных процессов в аногенитальной области после консультации врача.

**Применение по указанным назначениям** основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка.** 5 г (2 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 1/4-1/2 стакана настоя 3-4 раза в день.

## СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Министерство здравоохранения

Республики Беларусь

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

№ 12/11-р. от 12.07.2011 г.

Республики Беларусь

Чайные ложки 2-4 раза в день, детям от 6 до 12 лет – по 1/4 стакана

настоя 2-4 раза в день.

Для приема внутрь применяется у детей старше 6 месяцев ~~после консультации врача~~. Для приема внутрь по назначению врача: детям от 6 месяцев до 2 лет – ~~по 1-2 чайные ложки 2-4 раза в день, детям от 2 до 6 лет – по 1-2 столовые ложки 2-4 раза в день, детям от 6 до 12 лет – по 1/4 стакана настоя 2-4 раза в день.~~

**Местно и наружно** взрослым и детям старше 12 лет применять для полосканий (по 1/2-1 стакану настоя 3-5 раз в день), орошений, примочек.

Взрослым и детям старше 12 лет применять для клизм и микроклизм, спринцеваний, при необходимости для одной процедуры настой довести кипяченой водой до 1 литра.

Пред употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Побочное действие.** Возможны реакции гиперчувствительности, включая тяжелые аллергические реакции после нанесения препаратов цветков ромашки на слизистые оболочки (нарушение дыхания, ангионевротический отек, сосудистый коллапс, анафилактический шок). Частота не известна. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к ромашке, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема.

**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Применение у детей.** Для приема внутрь применяется у детей старше 6 месяцев после консультации врача (см. раздел «Способ применения и дозировка»). Для приема внутрь не применять у детей до 6 месяцев. Для местного и наружного применения не рекомендуется для детей до 12 лет.

**Применение в период беременности и кормления грудью.** Применение во время беременности и кормления грудью по назначению врача, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка. Женщинам во время беременности и кормления грудью перед применением лекарственного средства необходима консультация врача. В случае наружного применения необходимо удалить лекарственное средство с молочной железы женщины, кормящей грудью, перед кормлением, чтобы предотвратить сенсибилизацию ребенка.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Исследования не проводились.

Получены сообщения о возможном взаимодействии препаратов цветков ромашки при приеме более двух месяцев в высоких дозах с лекарственными средствами, метаболизм которых происходит с участием ферментов системы CYP450 (циклоспорин у пациентов после трансплантации почки). В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Меры предосторожности.** Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой.** Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приложение к сроку годности, указанного на упаковке  
Республики Беларусь

**Срок годности.** 1 год 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

**Производитель.** ООО «Калина».

**Адрес.** Республика Беларусь,  
211019, Витебская область,  
Оршанский район, д. Пищалово  
Тел. (0216) 54-81-68