

6916 - 2019

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГРУДНОЙ СБОР № 2

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

(PECTORALES SPECIES № 2)

от « 3,1 -12- 2019 » г. № 1564

**Основные физико-химические свойства:** смесь неоднородных кусочков зеленого, буровато-зеленого, беловато-серого и светло-желтого цвета, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2000 мкм; запах отсутствует.

**Состав:** 1 фильтр-пакет содержит: мать-и-мачехи листьев 0,6 г, подорожника большого листьев 0,45 г, солодки корней 0,45 г.

**Форма выпуска.** Сбор (порошок крупный).

**Фармакотерапевтическая группа.** Отхаркивающие средства в комбинации.

**Фармакологические свойства.** Оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

**Показания к применению.** В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (трахеит, бронхит).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема. Артериальная гипертензия, холестаза, хронический гепатит, цирроз печени, заболевания печени и/или почек, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипокалиемия, аритмия, заболевания сердца (миокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда), беременность, период кормления грудью, детский возраст до 18 лет.

**Меры предосторожности.** Лекарственное средство не применять более 4 недель в течение года. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

Не следует принимать одновременно другие средства, содержащие солодку, из-за риска развития серьезных побочных реакций, таких как задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма. Лекарственное средство не рекомендуется применять пациентам с заболеваниями почек, печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как они более чувствительны к неблагоприятным последствиям приема препаратов корня солодки.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не рекомендовано одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами.

Корень солодки, входящий в состав лекарственного средства, может препятствовать действию антигипертензивных средств.

При одновременном применении с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами, тиазидными и петлевыми диуретиками, кортикостероидами и слабительными средствами возможно усиление гипокалиемии, совместный прием с данными средствами не рекомендован. Применение одновременно с противоаритмическими средствами может привести к гипокалиемии и тяжелой желудочковой тахикардии.

НД РБ

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

6916 - 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Особые предостережения.**

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации противопоказано.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Дети.** Применение у детей в возрасте до 18 лет противопоказано.

**Способ применения и дозы.** 1 фильтр-пакет (1,5 г) поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакет отжать. Перед употреблением водное извлечение (чай) рекомендуется взбалтывать. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным. Принимать водное извлечение (чай) в теплом виде 3-4 раза в сутки после еды взрослым по 1/2 стакана (100 мл).

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

В связи с содержанием листьев мать-и-мачехи не рекомендован прием лекарственного средства более 4 недель в течение года.

**Передозировка.** Длительный прием (более 4-6 недель) и/или чрезмерные дозы могут привести к развитию псевдоальдостеронизма (гипокалиемия, задержка натрия, отеки, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, увеличение веса), в редких случаях может наблюдаться развитие миопатии и миоглобинурии, гипертонической энцефалопатии.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Срок годности.** 3 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.** Хранить при комнатной температуре (15-25 °С), в защищенном от влаги, света и недоступном для детей месте. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

**Упаковка.** Порошок крупный по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Название и местонахождение производителя.**

ЧАО «Лектравы».

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.