

НД РБ

Листок-вкладыш

4240 - 2018

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

от «28, 03 2018 г. № 275

КЛС № 2 от «05, 03 2018

Инструкция по медицинскому применению для наименования:
СБОР УРОЛОГИЧЕСКИЙ-ЛЕРОС

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: СБОР УРОЛОГИЧЕСКИЙ-ЛЕРОС
МНН – нет

Лекарственная форма: сбор растительный

Описание. Смесь измельченного растительного сырья с ароматическим запахом
Состав.

1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит:

Betulae folium/ лист березы	0,413 г
Uvae ursi folium/лист толокнянки	0,337 г
Ononis radix/корень стальника	0,150 г
Petroselinii radix/корень петрушки	0,150 г
Polygoni avic herba/трава горца птичьего	0,165 г
Urticae herba/трава крапивы	0,150 г
Millefolii herba/трава тысячелистника	0,105 г
Sambuci nigrae flos/цветы бузины	0,030 г

Фармакотерапевтическая группа. Прочие лекарственные средства.

Код АТС: V03AX

Показания к применению. Применяется в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей (цистит, уретрит).

Применение данного комбинированного лекарственного средства из компонентов растительного происхождения основано исключительно на опыте традиционного многолетнего использования.

Способ применения и дозы.

1 фильтр-пакет заливают стаканом (250 мл) кипящей воды, настаивают 10 минут в закрытой посуде, после чего фильтр-пакет вынимают. Для увеличения эффекта рекомендуется добавить к настою питьевую соду на кончике ножа. Настой пьют теплым 3-5 раз в день, непосредственно после приготовления.

Противопоказания

Отеки, вызванные сердечной и почечной недостаточностью, беременность, кормление грудью, детский возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, заболевания почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, окклюзия желчевыводящих путей, заболевания желчного пузыря.

Побочные действия. Возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота). Существует также возможность развития аллергических кожных реакций.

Передозировка. Возможность раздражения желудка.

В случае передозировки необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Без консультации с врачом принимать не дольше 2 недель. Лечение можно повторять не чаще 5 раз в год. Может вызвать окрашивание мочи в коричневый цвет. Ввиду недостаточных данных и необходимости медицинского наблюдения не рекомендовано принимать препарат детям и подросткам до 18 лет.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не употреблять с лекарствами и продуктами питания, понижающими pH мочи. В связи с содержанием травы горца птичьего не рекомендовано одновременное применение с антикоагулянтными средствами.

НД РБ

4240 - 2018

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Беременность и лактация

Употребление препарата в период беременности и кормления грудью противотоксиганта

Влияние на способность управления транспортными средствами и обслуживания станков

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и работу с движущимися механизмами не проводились.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °C в защищенном от света и влаги, недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек. Без рецепта.

Упаковка. По 1,5 г сбора в фильтр-пакете. 20 фильтр-пакетов в картонной пачке, обтянутой упаковочной пленкой из полипропилена.

Общая масса содержимого в упаковке 30 г

Производитель: Фирма LEROS s.r.o. , У Народной галереи, 470 156 15 Прага 5 – Зbraslav,
Чешская Республика

www.leros.cz

e-mail: leros@leros.cz