

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

СЕДАТИФ ПС®, Таблетки

Регистрационный номер

Название лекарственного средства
СЕДАТИФ ПС®

Лекарственная форма
Таблетки.

Описание

Круглая, двояковыпуклая, гомогенная таблетка с гравировкой SEDATIF P.C. на одной поверхности; белая, без запаха или со слабым запахом.

Состав

В таблетке:

Активные вещества:

Борец клубочковый (Aconitum napellus) 6 СН.....	0.5 мг
Белладонна (Belladonna) 6 СН.....	0.5 мг
Календула аптечная (Calendula officinalis) 6 СН.....	0.5 мг
Чистотел большой (Chelidonium majus) 6 СН.....	0.5 мг
Абрус молитвенный (Abrus precatorius (Jequirity)) 6 СН.....	0.5 мг
Калина обыкновенная (Viburnum opulus) 6 СН.....	0.5 мг

Вспомогательные вещества:

сахароза, лактоза моногидрат, магния стеарат.

Фармакотерапевтическая группа


У03АХ: Прочие лекарственные препараты. Гомеопатическое лекарственное средство.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Традиционно применяется в комплексном лечении тревожного расстройства легкой степени выраженности, беспокойства и бессонницы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам или любому из вспомогательных веществ.



Выраженное тревожное расстройство.
Дети до 3 лет.

Меры предосторожности

Если врачи обнаружили у Вас непереносимость некоторых видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого лекарственного средства.

Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Просьба сообщить врачу или фармацевту, если вы принимаете в настоящее время или недавно принимали любые лекарственные средства, даже отпускаемые не по рецепту, поскольку лекарственные средства могут изменять эффекты друг друга.

Беременность и лактация

В отсутствие экспериментальных и клинических данных, и в качестве меры безопасности, не рекомендуется использовать это лекарственное средство во время беременности и лактации.

Влияние на управление транспортными средствами или потенциально опасными механизмами

Не влияет.

Важная информация о некоторых компонентах препарата

Этот препарат содержит сахарозу и лактозу. Если вам известно, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу за советом перед применением этого лекарственного средства.

Дозировка и способ применения

Внутрь.

Медленно рассасывать по 2 таблетки 3 раза в день.

Детям с 3 до 6 лет перед приемом растворять таблетки в воде.

Длительность лечения 7-14 дней по рекомендации врача. Прием препарата не должен превышать двух недель. При этом необходимо консультироваться с врачом в случае, если симптомы усиливаются или не прекращаются после 7 дней лечения.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Побочное действие

У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций. При возникновении побочных эффектов необходимо обратиться к врачу.

СОБЛЮЖАЮЩИХ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия хранения и срок годности

Срок годности: 5 лет.

Препарат не нуждается в особых условиях хранения.

Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Упаковка

Блистеры ПВХ/Ал с 40 таблетками (20 таблеток в блистере, 2 блистера в упаковке) помещенные в картонную коробку.

Информация о производителе (заявителе)

БУАРОН
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
франция

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь