

Инфлюцид
Таблетки

Листок-вкладыш. Информация для пациентов

Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед тем, как начать принимать данное лекарственное средство.

Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова.
Дополнительную информацию или совет Вы сможете получить у Вашего врача и у Вашего фармацевта.

Общие физико-химические свойства

Таблетки белого или почти белого цвета, плоские, со скошенной кромкой, возможны незначительные вкрапления.

Состав лекарственного средства

1 таблетка (250 мг) содержит:

Активные вещества: Aconitum (аконит аптечный) D3 25 мг, Gelsemium (гельземий вечнозелёный) D3 25 мг, Ipsecacuanha (ипекакуана) D3 25 мг, Phosphorus (фосфор) D5 25 мг, Bryonia (переступень двудомный) D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum (посконник пронзённостистный) D1 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, магния стеарат.


Форма выпуска

Таблетки

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

Код АТС: R05X. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

**Показания к применению**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний. Традиционно применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата (см. раздел «Состав лекарственного средства»); непереносимость пшеничного крахмала; дефицит лактазы, непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (см. раздел «Особые меры предосторожности»).

Детям до 1 года (в связи с отсутствием достаточного опыта применения).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

Особые меры предосторожности

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. В этом случае следует прекратить приём препарата и проконсультироваться с врачом.

При сохранении высокой температуры тела более 3 суток или при её повышении более 39°C, при сохранении симптомов или появлении новых симптомов, следует проконсультироваться с врачом, так как может потребоваться назначение дополнительных обследований и другого лечения.

Предостережение для пациентов с целиакией. Инфлюцид содержит пшеничный крахмал, который может содержать небольшое количество глютена.

Пациентам с аллергией на пшеницу применять лекарственное средство не рекомендуется.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать данное лекарственное средство.

В связи с отсутствием достаточного опыта применения, Инфлюцид не следует применять у детей до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинических данных о применении лекарственного средства во время беременности и лактации недостаточно. Во время беременности и лактации препарат следует применять только после консультации с врачом, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребёнка).

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Инфлюцид применяют следующим образом:

При острых состояниях: взрослые и подростки с 12 лет: следует принимать по 1 таблетке каждые полчаса – 1 час (до 6 раз в сутки). Увеличение суточной дозы и длительности приёма более недели может осуществляться только после консультации с врачом. При уменьшении выраженности симптомов частота приёма снижается – по 1 таблетке 1-3 раза в сутки. В дальнейшем по мере улучшения состояния частота приёма снижается дополнительно.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают не более 4 таблеток в сутки (не более двух третей от суточной дозы у взрослых).

Дети в возрасте до 6 лет получают не более 3 таблеток в сутки (не более половины суточной дозы взрослых).

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. При лечении детей до 6 лет таблетки рекомендуется растворять в небольшом количестве воды.

Гомеопатические лекарственные средства не должны использоваться в течение длительного времени без консультации врача.

Передозировка

Вредное действие в случае передозировки не ожидается.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам Инфлюцид может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Зарегистрированы следующие нежелательные реакции:

Частота неизвестна – исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно: реакции гиперчувствительности, такие как высыпания на коже или желудочно-кишечные расстройства.

Сообщение о побочных эффектах

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Не влияет.

Срок годности

5 лет.

Дата истечения срока годности указана на упаковке препарата. Не применяйте препарат после этой даты.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 101/01/2018

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 до 25°C в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска.

Отпускается без рецепта.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере из плёнки ПВХ и фольги алюминиевой. 3 блистера пакуют в картонную коробку с листком-вкладышем для пациентов.

Информация о производителе (заявителе)

Заявитель / Владелец регистрационного удостоверения:

Дойче Хомеопати Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел.: + 49 (0)721 40 93-01

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. + 49 (0)721 40 93-01

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко КГ,
Германия

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG.,
Germany

Представитель в Республике Беларусь

Representative office of "Alpen Pharma AG"
220053 Minsk, Parhomenko street 3, office 1B
Tel./Fax (+375 17) 3480642.

Представительство компании "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
22053 г, Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
Тел./факс (+375 17) 3480642.