

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
КЛЕЙ БФ-6

Регистрационный номер. ЛП-001348

Торговое наименование. Клей БФ-6

Лекарственная форма. Раствор для наружного применения

[спиртовой]

Состав на 100 г.

Активное вещество:

Фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый на сухое вещество)  
в растворе со спиртом этиловым 95 % - 1,65 г

Вспомогательные вещества:

Поливинилбутират (поливинилбутираль) - 9,7 г  
Дибутилфталат - 3,5 г  
Касторовое масло - 1,75 г  
Канифоль - 0,85 г  
Спирт этиловый 95 % - 82,55 г

Описание: прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код ATX: D08AE

Фармакологические свойства

Клей БФ-6 обладает ранозаживающим и антисептическим действием. Используется как изолирующее средство, способствует заживлению мелких кожных ран вследствие образования на их поверхности изолирующей пленки. Пленка эластична и устойчива к механическим и химическим воздействиям.

Показания для применения Клей БФ-6 применяется для обработки микротравм – ссадин, царапин, порезов.

Противопоказания для применения Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до одного года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: возможное применение лекарственного препарата.

Способ применения и дозы  
Наружно. Перед нанесением препарата участок кожи тщательно

очищают от загрязнений. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и подсушивают место, подлежащее покрытию kleem. Препарат наносят тонким, равномерным слоем непосредственно на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки поверх нее наносят новую пленку. Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается на коже.

**Передозировка**

При указанном способе применения практически невозможна.

**Побочные действия**

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Нет данных.

**Особые указания** Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

**Форма выпуска.** Раствор для наружного применения [спиртовой].

По 5, 10, 15, 25, 40 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полистиленовыми и крышками пластмассовыми навинчивающимися.

По 5, 10, 15, 25, 40 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полимерными с уплотнительными элементами.

По 5, 10, 15, 25, 40 г в тубы алюминиевые с колпачками из полизтилена.  
По 5, 10, 30 г во флаконы-капельницы полимерные.

Каждый флакон, флакон-капельницу или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C, вдали от источников нагрева и открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** 4 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73