


**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
(информация для пациентов)

**Хартил® Амло капсулы 5 мг/5 мг**  
**Хартил® Амло капсулы 5 мг/10 мг**  
**Хартил® Амло капсулы 10 мг/5 мг**  
**Хартил® Амло капсулы 10 мг/10 мг**  
(рамиприл/амлодипин)



**Внимательно прочитайте всю эту инструкцию перед началом приема препарата.**

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство назначено Вам. Не передавайте его другим людям. Оно может нанести им вред, даже если у них имеются те же симптомы заболевания.
- Если какой-либо побочный эффект будет Вас серьезно беспокоить, или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, следует сообщить об этом своему врачу или фармацевту.

**Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:**

1. Что такое препарат Хартил® Амло для чего его применяют
2. Что следует знать до начала применения препарата Хартил® Амло
3. Как следует применять препарат Хартил® Амло
4. Возможные побочные эффекты
5. Как следует хранить Хартил® Амло
6. Срок годности
7. Условия отпуска из аптек
8. Дополнительная информация

**1. Что такое препарат Хартил® Амло и для чего его применяют**

Хартил® Амло содержит два активных вещества - рамиприл и амлодипин. Рамиприл относится к группе лекарственных средств, называемых ингибиторами АПФ (ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента), а амлодипин относится к группе лекарственных средств, называемых блокаторами кальциевых каналов.

**Действие рамиприла:**

- снижает в Вашем организме выработку веществ, которые могут вызывать повышение кровяного давления.
- расслабляет и расширяет Ваши кровеносные сосуды.
- облегчает Вашему сердцу работу по перекачиванию крови во всем организме.

**Действие амлодипина:**

- расслабляет и расширяет Ваши кровеносные сосуды, что облегчает прохождение крови по сосудам.

Хартил® Амло может применяться для лечения пациентов с высоким кровяным давлением (гипертензией), на которых оба препарата по отдельности, принимаемые одновременно в тех же дозах, что и в комбинации, оказывают адекватное действие.

## 2. Что следует знать до начала применения препарата Хартил® Амло

**Не следует принимать Хартил® Амло в следующих случаях:**

- если у Вас аллергия на рамиприл, амлодипин (активные вещества), любой другой блокатор кальциевых каналов или ингибиторы АПФ, а также на любое из вспомогательных веществ препарата Хартил® Амло, приведенных в разделе 8;
- Признаками аллергической реакции могут являться сыпь, покраснение кожи, затруднения при глотании или нарушения дыхания;
- если у Вас серьезное сужение сосудов, препятствующее оттоку крови из левого желудочка (например, сужение аортального сердечного клапана) или кардиогенный шок (состояние, при котором сердце не способно перекачивать необходимое количество крови);
- если у Вас когда-либо возникала тяжелая аллергическая реакция, называемая ангионевротическим отеком (отеком Квинке), признаками которого являются зуд, аллергическая сыпь (крапивница), красные следы на руках, ногах и шее, отек горла и языка, отеки вокруг глаз и губ, затрудненное дыхание и глотание;
- если Вам назначен диализ или любой другой вид фильтрации крови. В этом случае прием препарата Хартил® Амло, в зависимости от используемой аппаратуры или разновидности мембран, может оказаться для Вас неэффективным или небезопасным;
- если Вы страдаете заболеваниями почек, при которых уменьшен приток крови к Вашей почке (стеноз почечной артерии);
- если у Вас аномально низкое или нестабильное кровяное давление. В этом случае Ваш лечащий врач должен дать свое заключение;
- если у Вас сердечная недостаточность после инфаркта миокарда;
- если Вы находитесь на 2-м и 3-м триместре беременности;
- если Вы страдаете диабетом, нарушением функции почек или, если Вам назначено лечение препаратами, понижающими артериальное давление, которые содержат алискирен.

Не принимайте препарат Хартил® Амло, если хотя бы одно из описанных выше состояний относится к Вам. Если Вы не уверены в этом, то, прежде чем принимать Хартил® Амло, проконсультируйтесь с врачом.

### **Меры предосторожности при медицинском применении**

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, можно ли Вам принимать препарат в следующих случаях:

- если Вы пожилой человек;
- если Вы страдаете функциональными расстройствами сердца, печени или почек;
- если у Вас резко поднялось кровяное давление (гипертонический криз);
- если нарушен водно-солевой баланс Вашего организма [обезвоживание вследствие рвоты, поноса, повышенной потливости или приема диуретиков (мочегонных препаратов) в течение длительного времени, либо недостаток соли вследствие нахождения на низко-солевой диете или проведения диализа];
- если Вы собираетесь пройти курс лечения для уменьшения аллергической реакции на укусы пчел или ос (десенсибилизация);
- если Вам назначили обезболивающие препараты. Это может произойти при планировании хирургической или стоматологической операции. Возможно, тогда Вам придется заблаговременно, за день до назначенной процедуры, прекратить прием препарата Хартил® Амло и обратиться к врачу за советом;
- если у Вас обнаружен повышенный уровень калия в крови (по результатам биохимического анализа крови);
- если Вы принимаете препараты или страдаете заболеваниями, приводящими к понижению содержания натрия в крови. Ваш лечащий врач может назначить Вам регулярное

проведение анализов крови, с целью определения уровня натрия в крови, особенно, если Вы человек пожилого возраста;

- если Вам назначены препараты, называемые mTOR (такие как тензиролиму, эверолиму, сиролиму) или вилдаглиптин, так как эти препараты могут повысить риск развития ангионевротического отека, который является тяжелой аллергической реакцией;
- если Вы страдаете коллагенными заболеваниями, например, склеродермией или системной красной волчанкой;
- если Вы принимаете любой из нижеприведенных препаратов, понижающих артериальное давление:
  - блокаторы рецепторов ангиотензина - II (БРА), также известные как сартаны, например, валсартан, телмисартан, ирбесартан, особенно, если Вы страдаете почечными заболеваниями, связанными с диабетом;
  - алискирен.

Возможно, Ваш лечащий врач будет регулярно проверять функцию почек, измерять Ваше артериальное давление и уровень электролитов (калия, натрия) в крови.

Также ознакомьтесь с информацией, приведенной в разделе «Не принимайте препарат Хартил® Амло в следующих случаях».

Обязательно сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы беременны, предполагаете, что беременны или планируете беременность. На ранних сроках беременности не рекомендуется принимать препарат Хартил® Амло. Препарат нельзя принимать, если срок беременности более 3 месяцев. Прием препарата в этот период может причинить серьезный вред плоду (см. раздел «Беременность и грудное вскармливание»).

*Если хотя бы один из перечисленных выше пунктов касается Вас (либо Вы в этом не уверены), то, прежде чем принимать Хартил® Амло, проконсультируйтесь с врачом.*

#### **Дети и подростки в возрасте до 18 лет**

Не рекомендуется назначать Хартил® Амло детям и подросткам моложе 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата в этой группе пациентов не определена.

#### **Другие лекарственные средства и препарат Хартил® Амло**

Обязательно сообщите врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарственные средства, включая лекарственные средства, отпускаемые без рецепта (в том числе, лекарственные средства растительного происхождения). В этих случаях Хартил® Амло может повлиять на действие других лекарственных средств. Кроме того, некоторые лекарственные средства могут повлиять на действие Хартил® Амло

Обязательно сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете любое из следующих лекарственных средств. Они могут повлиять на действие препарата Хартил® Амло и снизить его эффективность:

- лекарственные средства, применяемые для облегчения симптомов боли и воспаления (например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или индометацин, а также аспирин);
- лекарственные средства, применяемые для лечения пациентов с пониженным кровяным давлением, а также при шоке, сердечной недостаточности, астме или аллергии, такие как эфедрин, норадrenalин и адреналин. Врач должен проверить Ваше артериальное давление;
- рифампицин (антибиотик, используемый для лечения пациентов с туберкулезом);
- зверобой продырявленный / *Hypericum perforatum* (лечение травмами при депрессии).

Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете любое из следующих лекарственных средств. При одновременном приеме с препаратом Хартил® Амло они могут повысить риск

возникновения побочных эффектов. Возможно, у Вашего лечащего врача возникнет необходимость изменить дозу препарата или принять иные меры предосторожности, которые приведены ниже:

- лекарственные средства, применяемые для облегчения симптомов боли и воспаления (например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или индометацин, а также аспирин);
- лекарственные средства, назначаемые при онкологических заболеваниях (при прохождении курса химиотерапии);
- лекарственные средства, препятствующие отторжению органов после трансплантации, такие как циклоспорин;
- диуретики (мочегонные средства), такие как фуросемид;
- лекарственные средства, которые могут повысить концентрацию калия в крови, такие как спиронолактон, триамтерен, амилорид, препараты калия и калийсодержащие заменители пищевой соли, а также гепарин (препарат, препятствующий свертыванию крови);
- стероидные противовоспалительные лекарственные средства, такие как преднизолон;
- аллопуринол (используется для понижения содержания мочевой кислоты в крови);
- прокаинамид (препарат для поддержания нормального сердечного ритма);
- темсиролимус (препарат для лечения некоторых онкологических заболеваний);
- сиролимус, эверолимус (препараты, предотвращающие отторжение пересаженных органов);
- вилдаглиптин (препарат для лечения диабета 2 типа);
- кетоназол, итраконазол (используются для лечения грибковых заболеваний);
- эритромицин, кларитромицин (антибиотики, используемые при некоторых бактериальных инфекциях);
- ритонавир, индинавир, нелфинавир (так называемые ингибиторы протеазы, используются для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов);
- верапамил, дилтиазем (для лечения ряда болезней сердца и высокого кровяного давления);
- триметоприм и котримоксазол (антибиотики для лечения некоторых бактериальных инфекций);
- такролимус (препарат для контроля иммунной системы при пересадке органов);
- лекарственные средства блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) или алискирен (см. также информацию, приведенную в разделах «Не принимайте препарат Хартил® Амло в следующих случаях» и «Меры предосторожности при медицинском применении»).

Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете любое из следующих лекарственных средств – препарат Хартил® Амло может повлиять на них, изменяя их действие:

- лекарственные средства для лечения диабета, такие как инсулин и препараты для перорального применения, понижающие уровень глюкозы. Хартил® Амло может уменьшать уровень сахара в крови. При приеме препарата Хартил® Амло Вам следует постоянно контролировать содержание сахара в крови.
- препараты, содержащие литий (препараты для лечения психических расстройств). Хартил® Амло может повышать уровень лития в крови. Содержание лития в Вашей крови должно постоянно контролироваться врачом.
- циклоспорин (препарат, тормозящий функцию иммунной системы).
- симвастатин (лекарственное средство для понижения уровня холестерина в крови).

Если хотя бы один из перечисленных выше пунктов касается Вас (либо Вы в этом не уверены), то, прежде чем принимать Хартил® Амло, проконсультируйтесь с врачом.

**Прием препарата Хартил® Амло одновременно с пищей и напитками**

- Употребление спиртных напитков во время приема Хартил® Амло может вызвать у Вас чувство неопределенности, головокружения. Если у Вас возникнет вопрос, сколько спиртного можно потреблять во время приема препарата Хартил® Амло, то обсудите этот вопрос с врачом. Алкоголь и лекарственные средства, используемые для снижения кровяного давления, могут усиливать седативный эффект друг друга.
- Грейпфрут и сок грейпфрута не рекомендуется пациентам, принимающим препарат Хартил® Амло, так как это может повысить уровень амлодипина (одного из действующих веществ) в крови, приводя к непредсказуемому усилению антигипертензивного эффекта (резкого падения артериального давления) препарата Хартил® Амло.
- Принимать Хартил® Амло можно до и после еды.

**Фертильность, беременность и период грудного вскармливания**

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете беременность, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту до начала применения этого препарата.

**Беременность**

Не следует принимать препарат Хартил® Амло в течение первых 12 недель беременности. Начиная с 13-й недели беременности препарат противопоказан. Прием препарата в этот период может вызвать серьезные нарушения развития плода.

Если Вы забеременели во время курса лечения препаратом Хартил® Амло, то Вам следует немедленно сообщить об этом Вашему лечащему врачу.

Переход на соответствующее альтернативное лечение должен быть выполнен до начала планируемой беременности.

**Грудное вскармливание**

Прием Хартил® Амло в период грудного вскармливания не рекомендуется.

*Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед приемом любого лекарственного средства, если Вы беременны или кормите ребенка грудью.*

**Влияние на способность управления транспортными средствами и работу с механизмами**

Препарат Хартил® Амло может повлиять на Вашу способность управления транспортными средствами и работу с механизмами.

Во время приема препарата Хартил® Амло Вы можете испытывать головокружение, тошноту, усталость или головную боль. Если это происходит, то Вам следует отказаться от вождения транспортных средств и обслуживания машин и механизмов и немедленно обратиться к врачу.

**Препарат Хартил® Амло содержит красители:**

В состав оболочки капсул 5мг/5мг и 10мг/5мг входит краситель красный очаровательный (*allura red AC-FD&C Red 40 (E-129)*), а капсул 5мг/10мг и 10мг/10мг - азорубин (кармуазин) (E-122). Эти красители могут вызвать аллергическую реакцию.

**3. Как следует применять препарат Хартил® Амло**

Всегда принимайте Хартил® Амло строго по назначению врача. Если Вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

**Режим дозирования**

- Обычно рекомендуемая доза составляет 1 капсулу с дозировкой препарата, назначенной врачом.
- В зависимости от терапевтического эффекта, Ваш лечащий врач может изменять дозу.

- Максимальная доза составляет 1 капсулу с дозировкой препарата 10/10 мг, один раз в день.

Назначение препарата при заболеваниях печени и почек

При заболеваниях печени и почек дозировка препарата может быть изменена.

Назначение препарата пожилым людям

Врач уменьшит начальную дозу препарата и замедлит подбор необходимой Вам дозы препарата.

Не рекомендуется назначать Хартил® Амло очень старым и немощным пациентам.

Назначение препарата детям и подросткам

Не рекомендуется назначать Хартил® Амло детям и подросткам моложе 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата в этой группе пациентов не определена.

Если Вы считаете, что терапевтический эффект препарата является слишком сильным или слишком слабым, то Вам следует проконсультироваться с врачом.

Важно принимать капсулы без перерывов. Не дожидайтесь, пока закончится Ваше лекарственное средство, вовремя обратитесь к врачу с просьбой выписать следующий рецепт.

**Если Вы приняли больше препарата Хартил® Амло, чем необходимо**

Прием большего, чем необходимо, количества капсул Хартил® Амло может привести к понижению или к опасному падению артериального давления. Вы можете почувствовать головокружение, слабость или потерять сознание. При достаточно тяжелом падении артериального давления может развиться шок. Ваша кожа может стать холодной и липкой, и Вы можете потерять сознание. Сообщите об этом врачу или незамедлительно обратитесь в отделение скорой помощи ближайшей больницы. Не управляйте автомобилем по дороге в больницу! Попросите это сделать других людей или вызовите скорую помощь. Сохраните использованную упаковку, пусть она находится при Вас. Ее осмотр поможет врачу точно определить, какую именно дозу препарата Вы приняли.

**Если Вы забыли принять Хартил® Амло**

Не беспокойтесь и не принимайте забытую дозу. В следующий раз примите обычную дозу препарата в обычное время. Не нужно принимать двойную дозу препарата для компенсации пропущенной дозы.

**Если Вы прекратили принимать Хартил® Амло**

Ваш лечащий врач определит необходимую Вам продолжительность лечения. До консультации с врачом не следует резко прерывать прием или изменять принимаемую дозу препарата, поскольку это может спровоцировать возврат Вашего заболевания.

Способ применения

- капсулы следует принимать внутрь в одно и то же время суток, каждый день на протяжении курса лечения, независимо от приема пищи
- капсулы следует проглатывать целиком, запивая их жидкостью
- не принимайте капсулы с соком грейпфрута
- капсулы не следует раздавливать или разжевывать.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению этого препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

**4. Побочное действие**

Хартил® Амло, как и все другие лекарственные средства, может вызывать побочные эффекты, хотя и не у всех пациентов.

**При возникновении любого из серьезных побочных эффектов, перечисленных ниже, Вам следует прекратить прием Хартил® Амло и немедленно обратиться к врачу – Вам может потребоваться срочная медицинская помощь:**

- отек лица, губ или горла, сопровождаемый затруднениями при глотании или дыхании, а также зуд и сыпь. Это может быть признаком тяжелой аллергической реакции на прием Хартил® Амло;
- тяжелые кожные реакции, включая сыпь, язвы в ротовой полости, обострение уже имеющихся кожных заболеваний, покраснение, образование волдырей или расслоение кожи (например, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз или мультиформная эритема).

**Немедленно обратитесь к врачу, если Вы испытываете:**

- учащение сердечного ритма, неровное или усиленное сердцебиение (ощущение сердцебиения), боли в груди, стеснение в груди или более серьезные нарушения, в том числе, инфаркт и инсульт;
- одышку или кашель - это может быть признаком нарушения дыхательной функции;
- частое возникновение кровоподтеков на коже, возникновение кровотечений, более продолжительных, чем обычно, а также любых других признаков кровотечения (например, кровотечение из десен), образование фиолетовых пятен на коже, либо более частую, чем обычно, заболеваемость инфекционными болезнями, боль в горле и лихорадку, чувство усталости, обморок, головокружение или бледность кожных покровов. Это может быть признаком нарушений со стороны кровеносной системы или костного мозга;
- тяжелые боли в животе, которые могут распространяться на область спины - это может быть признаком панкреатита (воспаления поджелудочной железы);
- лихорадку, озноб, усталость, потерю аппетита, боли в животе, тошноту, пожелтение кожи или глаз (желтуха). Это может быть признаком заболеваний печени, таких как гепатит (воспаление печени), или повреждения печеночной ткани.

**Другие побочные эффекты:** обратитесь к врачу, если любой из нижеперечисленных побочных эффектов станет усиливаться или продлится дольше нескольких дней.

Использованные ниже параметры частоты побочных эффектов определены следующим образом:

- частые: встречаются у 1 – 10 пациентов из 100
- нечастые: встречаются у 1 – 10 пациентов из 1 000
- редкие: встречаются у 1 – 10 пациентов из 10 000
- очень редкие: встречаются реже, чем у 1 пациента из 10 000
- частота неизвестна – невозможно определить на основании имеющихся данных

**Частые побочные эффекты**

- сонливость (особенно в начале лечения);
- ощущение сильного сердцебиения;
- покраснение лица (приливы);
- головная боль или ощущение усталости, слабости;
- головокружение. Это происходит, чаще всего, в начале курса терапии Хартил® Амло или при переходе на более высокие дозы препарата;
- нарушения зрения (в том числе, двоение в глазах);
- нарушение функции кишечника, включая диарею и запор;
- обмороки, гипотензия (аномально низкое кровяное давление), особенно когда Вы стоите или быстро садитесь;
- затрудненный сухой кашель, воспаление носовых пазух (синусит) или бронхит, одышка;
- боли в животе (в желудке или в области кишечника), диарея, несварение желудка, тошнота, рвота;


- сыпь на коже, с образованием волдырей и без таковых;
- боли в груди;
- судороги или боли в мышцах;
- обмороки;
- повышенный уровень калия в крови (выявленный в результате проведения анализа крови).

#### **Нечастые побочные эффекты**

- изменения настроения, бессонница;
- дрожь;
- звон в ушах;
- чихание/насморк, вызванные воспалением слизистой оболочки носа (ринит);
- выпадение волос;
- сыпь (экзантема);
- зуд, изменения цвета кожи;
- возросшая потребность к мочеиспусканию, особенно ночью, затруднения при мочеиспускании, более частые позывы на мочеиспускание;
- ухудшение функции почек;
- боли, плохое самочувствие;
- боль в спине;
- увеличение или уменьшение массы тела;
- дискомфорт и увеличение молочных желез у мужчин;
- нарушения равновесия с головокружением и ощущением вращения (вертиго);
- зуд и необычные кожные ощущения, такие как онемение, пощипывание, покалывание, жжение или ощущение мурашек на коже (парестезия), потеря чувствительности в коже (гипестезия);
- потеря или изменение вкусовых ощущений;
- расстройства сна;
- депрессия, тревожное состояние, повышенная нервозность или возбуждение;
- заложенность носа, обострение течения астмы;
- возникновение отека кишечника (называемого ангионевротическим отеком кишечника), выраженного симптомами боли в животе, рвотой и поносом;
- изжога, ощущение сухости во рту;
- скопление газов в желудке (гастрит);
- увеличение объема выделяемой мочи в течение дня;
- повышенная потливость;
- снижение или потеря аппетита (анорексия);
- учащение сердцебиения, замедление сердечного ритма или аритмия;
- отечность рук и ног. Это может быть признаком того, что в Вашем организме удерживается излишнее количество жидкости;
- расплывчатость зрения;
- боли в суставах;
- лихорадка;
- сексуальное бессилие у мужчин, снижение сексуального желания у мужчин и женщин;
- повышение количества некоторых белых кровяных клеток (эозинофилия), выявленное в результате проведения анализа крови;
- изменения функции печени, поджелудочной железы и почек, выявленные в результате проведения анализов крови и биохимических анализов;
- инфаркт миокарда.

#### **Редкие побочные эффекты**

Hartil Amlo caps PIL BY 201610





8615 - 2017

- состояние неуверенности или спутанность сознания;
- покраснение и опухание языка;
- выраженное расслоение или шелушение кожи, зуд, шероховатая кожная сыпь;
- болезни ногтей (например, ослабление или отделение ногтя от ногтевого ложа);
- сыпь на коже или кровоподтеки;
- пятна на коже или холодные конечности;
- покраснение глаз, зуд, отечность глаз или слезотечение;
- расстройства слуха;
- уменьшение количества красных кровяных телец (эритроцитов), белых кровяных телец (лейкоцитов) и кровяных пластинок (тромбоцитов), а также снижение уровня гемоглобина, выявленное в результате проведения анализов крови.

**Очень редкие побочные эффекты (регистрируются менее, чем у 1 пациента из 10000)**

- повышенное содержание сахара в крови;
- воспаление поджелудочной железы;
- воспаление печени, пожелтение кожи (желтуха);
- повышенная чувствительность к воздействию солнечных лучей (светочувствительность);
- гиперплазия десен (разрастание тканей десен);
- ригидность мышц, дрожь или нарушение движений;
- повышенный тонус мышц;
- воспаление сосудов.

**Другие зарегистрированные побочные эффекты (частота неизвестна)**

Обратитесь врачу, если любой из перечисленных ниже побочных эффектов станет усиливаться или продлится дольше нескольких дней.

- нарушение концентрации внимания;
  - припухлость рта;
  - воспаление слизистой оболочки ротовой полости с образованием мелких изъязвлений;
  - уменьшение количества кровяных телец, выявленное при проведении анализов крови;
  - снижение концентрации натрия в крови, выявленное при проведении биохимических анализов;
  - изменение цвета пальцев кистей и стоп на холоде, а при попадании в тепло ощущение болезненного покалывания (синдром Рейно);
  - замедление или нарушение психомоторных реакций;
  - ощущение жжения;
  - нарушение обоняния;
  - псориаз;
  - повышение уровня антител к клеточным ядрам (анализ крови);
  - концентрированная, темная цвета моча, спазм мышц, ощущение недомогания и приступы, обусловленные синдромом неадекватной секреции антидиуретического гормона.
- При возникновении таких симптомов немедленно обратитесь к Вашему лечащему врачу;
- дрожание, ригидная осанка, маскообразное лицо, медленные движения и шаркающая походка с нарушением равновесия.


**Сообщение о побочных эффектах**

При обнаружении любых побочных эффектов, в том числе и не упомянутых в данной инструкции, просьба обратиться к врачу или фармацевту.

Сообщая о побочных эффектах, Вы помогаете получить дополнительную информацию о безопасности этого препарата.

**5. Как следует хранить капсулы Хартил® Амло**

Hartil Amlo caps PIL BY 201610



Хранить при температуре не выше 30°C, в недоступном для детей месте.

## 6. Срок годности

Срок годности указан на упаковке.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке!

Датой истечения срока годности считается последний день указанного месяца.

## 7. Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту врача

## 8. Содержимое упаковки и другая информация

### Что содержится в препарате Хартил® Амло

Действующее вещество: одна капсула 5 мг/5 мг содержит 5 мг рамиприла и 5 мг амлодипина (в форме 6,95 мг амлодипина бесилата), 5 мг/10 мг содержит 5 мг рамиприла и 10 мг амлодипина (в форме 13,9 мг амлодипина бесилата), 10 мг/5 мг содержит 10 мг рамиприла и 5 мг амлодипина (в форме 6,95 мг амлодипина бесилата) и 10 мг/10 мг содержит 10 мг рамиприла и 10 мг амлодипина (в форме 13,9 мг амлодипина бесилата) соответственно.

Вспомогательные вещества: кросповидон, гипромеллоза, целлюлоза микрокристаллическая, глицерола дибегенат.

Состав капсулы CONI-SNAP-3 (5 мг/5 мг): бриллиантовый голубой (E-133), красный очаровательный (E-129), титана диоксид (E-171), желатин.

Состав капсулы CONI-SNAP-0 (5 мг/10 мг): титана диоксид (E-171), железа оксид красный (E-172), кармуазин (E-122), индигокармин + FD и С синий 2 (E-132), желатин.

Состав капсулы CONI-SNAP-0 (10 мг/5 мг): титана диоксид (E-171), железа оксид красный (E-172), бриллиантовый голубой (E-133), красный очаровательный (E-129), желатин.

Состав капсулы CONI-SNAP-0 (10 мг/10 мг): кармуазин (E-122), индигокармин + FD и С синий 2 (E-132), титана диоксид (E-171), желатин.

### Внешний вид капсул Хартил® Амло и содержимое упаковки

#### Внешний вид:

Хартил® Амло капсулы 5 мг/5 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 3, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием светло-бордового цвета и непрозрачной крышкой светло-бордового цвета.

Хартил® Амло капсулы 5 мг/10 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 0, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием светло-розового цвета и непрозрачной крышкой темно-бордового цвета.

Хартил® Амло капсулы 10 мг/5 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 0, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием светло-розового цвета и непрозрачной крышкой светло-бордового цвета.

Хартил® Амло капсулы 10 мг/10 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 0, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием темно-бордового цвета и непрозрачной крышкой темно-бордового цвета.


Смесь гранул и порошков белого или почти белого цвета, не содержащая механических примесей, без или почти без запаха.

#### Упаковка:

По 10 капсул в блистере из комбинированной пленки «cold»: (полиамид / алюминиевая фольга / ПВХ) // алюминиевая фольга. 3 или 9 блистеров помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению для пациентов.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ**

ЗАО «Фармацевтический Завод ЭГИС»  
1106 Будапешт, ул. Керестури 30-38  
ВЕНГРИЯ



НД РБ

8615 -2017