


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ЦИСТИКАПС



Торговое название: Цистикапс

Лекарственная форма: капсулы

Состав: одна капсула содержит: клюквы экстракта сухого стандартизированного (40% проантоцианидинов) в пересчете на проантоцианидины – 36,0 мг.

Вспомогательные вещества: лецитин (Солек В-10, соевый жидкий), воск пчелиный желтый, подсолнечное масло.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерин, вода очищенная, натрия бензоат Е-211, титана диоксид Е-171, красители: железа оксид красный Е-172, железа оксид черный Е-172, кармуазин Е-122.

Описание. Капсулы мягкие желатиновые овальной формы, красно-фиолетового цвета, непрозрачные, упругие, со швом.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие урологические препараты.

Код ATX G04BX.

Показания к применению

Лекарственное средство Цистикапс применяется в качестве вспомогательного средства в комплексной терапии заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей. Применение его основано на опыте длительного использования экстракта и со-ка клюквы при заболеваниях мочевыводящих путей.

Способ применения и дозы

Цистикапс принимают по 1 капсуле на ночь, запивая стаканом воды (после опорожнения мочевого пузыря). Длительность приема составляет от 2 до 4 недель. При необходимости курс повторяют.

При инфекциях мочевыводящих путей с болезненным мочеиспусканием и жжением во время мочеиспускания, а также после завершения курса лечения инфекций мочевыводящих путей антибиотиками следует принимать Цистикапс в течение, по крайней мере, 1 месяца.

Увеличение периода применения стабилизирует достигнутый эффект.

Меры предосторожности

Не превышайте указанную дозу.

Если состояние ухудшается или симптомы сохраняются больше одной недели, следует проконсультироваться с врачом.

Применение у детей и подростков в возрасте до 18 лет не рекомендуется, поскольку данных недостаточно.

Перед приемом препарата пациенту следует проконсультироваться с врачом при наличии следующих симптомов: лихорадка, судороги, боль в животе, боли в спине, гематурия, задержка мочи или недержание мочи.

Информация о вспомогательных веществах:

Лекарственное средство содержит в составе капсулы кармуазин Е-122, который может вызывать аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Индивидуальные сообщения о нежелательных реакциях указывают на возможное взаимодействие между варфарином и клюквенным соком, в большинстве случаев приводящее к увеличению МНО или кровотечению. Другие антагонисты витамина К, такие как аценокумарол и фениндион, иногда используемые вместо вар-

фарина, могут также потенциально взаимодействовать с клюквенным соком. На сегодняшний день нет сообщений о взаимодействии между клюковой и новыми антикоагулянтами прямого действия, которые не являются антагонистами витамина К (такими как апиксабан, эдоксабан, дабигатран и ривароксабан) или парентеральными антикоагулянтами (такими как гепарин, далтепарин, эноксапарин и тинзапарин); однако клиническое исследование демонстрирует потенциальное фармакодинамическое взаимодействие между клюковой и варфарином. Поэтому одновременное использование антикоагулянтных препаратов и продуктов из клюквенного сока противопоказано. Нет никаких доказательств того, что клюквенный сок оказывает клинически значимое влияние на фармакокинетику амоксициллина или нефексора.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

Побочное действие

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея (частота неизвестна).

Аллергические реакции: кожный зуд, кожная сыпь, краснота лица, ангионевротический отек и др.

Передозировка

О случаях передозировки лекарственного средства не сообщалось.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- отеки, обусловленные сердечной или почечной недостаточностью;
- заболевания почек (в настоящее время или в анамнезе), в том числе почечнокаменная болезнь;
- состояния, при которых рекомендовано ограничение приема жидкости, например, тяжелые заболевания сердца и почек;
- одновременный прием антикоагулянтов.

Беременность и период грудного вскармливания

Применение препарата Цистикапс во время беременности и в период кормления грудью не рекомендуется в связи с отсутствием достоверных данных о влиянии препарата на организм беременной женщины и на ребенка.

Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой

Не влияет.

Упаковка

Капсулы мягкие желатиновые, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке.

Условия хранения

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранят в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26
тел./факс (+ 37517) 276-01-59
e-mail: info@mic.by, www.mic.by

