


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства  
**ЭЛДОР,**  
раствор для местного и наружного применения 0,6 мг/мл  
(во флаконах)

**Название лекарственного средства:** ЭЛДОР.

**Международное непатентованное название:** Sodium hypochlorite.

**Общая характеристика:** лекарственное средство представляет собой прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор.

**Состав:** в 1 мл раствора содержится: *действующее вещество:* натрия гипохлорита раствор, содержащий 0,60 мг натрия гипохлорита;  
*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

**Форма выпуска:** раствор для местного и наружного применения.

**Фармакотерапевтическая группа:** Другие антисептические и дезинфицирующие средства.  
Гипохлорит натрия.

**Код АТХ:** D08AX07.

### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика

Антисептическое средство широкого спектра действия. Оказывает противовирусное, противогрибковое и бактерицидное действие.

#### Фармакокинетика

Раствор гипохлорита натрия при наружном и местном применении практически не всасывается в системный кровоток и не обладает кумулятивным, кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием.

### Показания к применению

Антисептическая обработка кожи и слизистых оболочек.

Местное лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний.

### Способ применения и дозы


Раствор готов к употреблению. Неразведенный раствор применять местно или наружно в виде полосканий, орошений, компрессов и аппликаций.

- антисептическая обработка кожи;
- антисептическая обработка ран, потертостей и трещин, ожогов;
- лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (тонзиллит, фарингит, глоссит, стоматит, гингивит): полоскание носоглотки 3-4 раза в сутки;

- лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости носа (риниты) и околоносовых пазух (синуситы): полоскание носоглотки 3-4 раза в сутки;
- профилактика послеоперационных осложнений: обработка операционных швов 1-2 раза в сутки в виде влажных аппликаций на 1,5-2 часа;
- инфекционные и инфекционно-аллергические поражения кожи: применение в виде полосканий и аппликаций. Длительность лечебного курса индивидуальна. Повязки необходимо менять 1 раз в сутки.

#### **Побочное действие**

Раздражение или чувство жжения: в основном наблюдается на участках поврежденной кожи (в случае больших ран).



#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

#### **Передозировка**

Случаи передозировки при местном и наружном применении неизвестны.

#### **Меры предосторожности**

Препарат предназначен только для местного и наружного применения. Не использовать для длительного лечения. Т.к. трансдермальный путь поступления препарата не может быть исключен, необходимо применять ЭЛДОР с осторожностью в следующих ситуациях: на большой поверхности, под окклюзионной повязкой, на поврежденной коже (в частности, ожоги). Возможно раздражение при наложении окклюзионной повязки. После короткого периода лечения без заметных результатов необходимо проконсультироваться с врачом. Случайное проглатывание или вдыхание препарата может вызвать серьезные побочные эффекты. Не допускать попадания в глаза. Повторное или длительное применение может вызвать явления сенсибилизации: в этом случае прекратить лечение и проконсультироваться с врачом, чтобы назначить соответствующее лечение. Активность снижается в присутствии белка, сыворотки и цельной крови. Препарат может растворить сгустки крови и вызвать кровотечение. При вскрытии возможно микробное загрязнение содержимого флакона. Не предназначен для дезинфекции медицинского или хирургического оборудования.

#### **Применение во время беременности и в период лактации**

Может использоваться во время беременности и в период лактации.

Не обрабатывать поверхность молочных желез перед кормлением.

#### **Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами**

Не влияет.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не применять с йодсодержащими антисептиками.

Следует избегать одновременного или последовательного использования других антисептических средств или мыла без предварительного тщательного промывания водой обрабатываемого участка (возможен антагонизм или инактивация).

**Условия хранения.** Во вторичной упаковке при температуре не выше 25°C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности.** 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 120 мл или 500 мл во флаконы полимерные, укупоренные полимерным колпачком. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

По 5000 мл во флаконы полимерные, укупоренные полимерным колпачком. На флакон наклеивают этикетку с инструкцией по медицинскому применению. Каждый флакон помещают в пакет из полиэтилена.

**Информация о производителе:** Белорусское предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФармЛэнд» (СП 000 «ФармЛэнд»), Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3, тел/факс +375 29 77 11 00

