

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично для Вас, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии таких же симптомов, что и у Вас.

Уролесан®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Уролесан®

Группировочное наименование: Душицы обыкновенной травы экстракт + Клещевины обыкновенной семян масло + Моркови дикой семян экстракт + Мята перечной листьев масло + Пихты сибирской хвой масло + Хмеля обыкновенного соплодий экстракт

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав:

1 мл препарата содержит:

Активные компоненты: пихты сибирской хвой масло – 67,60 мг; мяты перечной листьев масло – 16,90 мг; моркови дикой семян экстракт жидкий (1:1) – 194,35 мг; хмеля обыкновенного соплодий экстракт жидкий (1:1) – 278,80 мг; душицы обыкновенной травы экстракт жидкий (1:1) – 192,95 мг; клещевины обыкновенной семян масло – 92,95 мг.

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат – 0,04 мг.

Описание: жидкость от зеленовато-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: спазмолитическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: G04BC

При почечных и печеночных коликах разовая доза может быть повышена до 15-20 капель. Увеличение разовой дозы, длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача.

При отсутствии положительного эффекта от проводимой в течение 5-7 дней терапии препаратом или ухудшении состояния следует обратиться к врачу.

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 007159-050721

СОГЛАСОВАНО

Побочное действие

Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, общая слабость.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея, боли в животе);

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (покраснение лица, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек).

Нарушения со стороны сосудов: повышение артериального давления, снижение артериального давления.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: возможно усиление дозозависимых нежелательных реакций (тошноты, рвоты, болей в животе, головокружения).

Лечение: в случае передозировки препаратом Уролесан® следует немедленно обратиться к врачу. Лечение симптоматическое: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

Не применять препарат, если диаметр камней в почках превышает 3 мм.

Препарат содержит 60% этилового спирта. В максимальной разовой дозе препарата содержание абсолютного этилового спирта составляет 0,47 г, в максимальной суточной дозе препарата – 1,42 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

124369

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 007159-050721
СОГЛАСОВАНО

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 25 мл во флаконы темного стекла тип III (по Евр.Ф. или Ф.США) или марки ОС, ОС-1, укупоренные полиэтиленовыми пробками-капельницами с пластиковыми крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, также допускается использование крышек-капельниц без пробки.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (флакон в пачке) при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.


Срок годности

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.



Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел./факс (8332) 65-46-64, 65-35-10

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Арт-Фарм»

Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, дом 17-23, этаж 6

Тел./факс: 8-495-640-20-02; +7-967-054-36-98

E-mail: Vladislav.Gorbunov@art-pharm.ru

Генеральный директор

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»



С.Н.Федотовский

124369