


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**КОРИЗАЛИЯ®, Таблетки, покрытые оболочкой****Регистрационный номер****Название лекарственного средства**
КОРИЗАЛИЯ®**Лекарственная форма**
Таблетки, покрытые оболочкой.**Описание**

Блестящие белые цилиндрические двояковыпуклые покрытые оболочкой таблетки, без запаха.

Состав**Активные вещества:**

Лук репчатый (Allium сера) 3 СН	0.333 мг
Белладонна (Belladonna) 3 СН.....	0.333 мг
Сабадилла (Sabadilla) 3 СН	0.333 мг
Двухромовокислый калий (Kalium bichromicum) 3 СН.....	0.333 мг
Гельземий (Gelsemium) 3 СН.....	0.333 мг
Прострел (Pulsatilla) 3 СН.....	0.333 мг

Вспомогательные вещества:

Сахароза, Тальк, Акация, Магния стеарат, Желатин, Белый пчелиный воск, Воск карнаuba.

Фармакотерапевтическая группа

V03AX: Прочие лекарственные препараты. Гомеопатическое лекарственное средство.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Традиционно применяется для облегчения симптомов простуды и ринита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам или любому из вспомогательных веществ.

Дети до 2 лет.

Меры предосторожности

Если врачи обнаружили у Вас непереносимость некоторых видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого лекарственного средства.

Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Просьба сообщить врачу или фармацевту, если вы принимаете в настоящее время или недавно принимали любые лекарственные средства, даже отпускаемые не по рецепту, поскольку лекарственные средства могут изменять эффекты друг друга.

Беременность и лактация

В отсутствие экспериментальных и клинических данных, и в качестве меры безопасности, не рекомендуется использовать это лекарственное средство во время беременности и лактации.

Влияние на управление транспортными средствами или потенциально опасными механизмами

Не влияет.

Важная информация о некоторых компонентах препарата

Этот препарат содержит сахарозу. Если вам известно, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу за советом перед применением этого лекарственного средства.

Дозировка и способ применения

Сублингвально.

Взрослые и дети в возрасте от 2 лет: по 1 таблетке 6-8 раз в день.

При улучшении состояния частота приема уменьшается.

Медленно рассасывать во рту до полного растворения.

Дети. Коризалия®, таблетки, покрытые оболочкой, рекомендованы для детей от 2 лет.

Детям в возрасте до 6 лет перед приемом таблетку рекомендуется измельчить и растворить в воде.

Продолжительность лечения не должна превышать 1 недели.


Вы должны обратиться к врачу, если не чувствуете улучшений или в случае ухудшений спустя 5 дней после начала приема препарата.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Побочное действие

У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций.



Условия хранения и срок годности

Срок годности: 5 лет.

Препарат не нуждается в особых условиях хранения.

Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Упаковка

Блистеры ПВХ/Ал с 20 таблетками, покрытыми оболочкой, 2 блистера в картонной коробке.

Информация о производителе (заявителе)

БУАРОН

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

франция

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь