

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Тетрациклин

Регистрационный номер: ЛС-002178

Торговое наименование: Тетрациклин

Международное непатентованное наименование: тетрациклин

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г:

Действующее вещество:  
Тетрациклина гидрохлорид - 3,226 г  
(экв. 3,000 г тетрациклина)

Вспомогательные вещества:

Ланолин (ланолин безводный) - 3,000 г  
Церезин - 1,000-3,000 г  
Натрия дисульфит (натрия пиросульфит) - 0,050 г  
Вазелин - до 100,000 г

Описание: однородная мазь желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: антибиотик, тетрациклин

Код АТХ: D06AA04

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Бактериостатический антибиотик широкого спектра из группы тетрациклинов. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к подавлению синтеза белка.

Активен в отношении грамположительных микроорганизмов (*Staphylococcus spp.* в т.ч. продуцирующие пенициллиназу; *Streptococcus spp.* (в т.ч. *Streptococcus pneumoniae*), *Haemophilus influenzae*, *Listeria spp.*, *Bacillus anthracis*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Neisseria gonorrhoeae*, *Bordetella pertussis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, а также *Rickettsia spp.*, *Chlamydia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Treponema spp.*).

Не активен в отношении: *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Serratia spp.*, большинство штаммов *Bacteroides spp.* и грибов, вирусы, бета-гемолитические стрептококки группы А (включая 44 % штаммов *Streptococcus pyogenes* и 74 % штаммов *Streptococcus faecalis*).

Фармакокинетика

При нанесении на неповрежденную кожу практически не всасывается.

Показания к применению

- гнойные инфекции мягких тканей,
- фурункулез,
- экземы инфицированные,
- сыпь, угревая сыпь,
- фолликулит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к тетрациклину или другим компонентам препарата, грибковые поражения кожи, детский возраст (до 11 лет).

С осторожностью

С осторожностью назначают пациентам с аллергическими реакциями в анамнезе.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение мази для наружного применения при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется. В небольших количествах возможно проникновение тетрациклина в общее кровяное русло и через плаценту к плоду. Действующее вещество мази – тетрациклин может выделяться с грудным молоком.

#### **Способ применения и дозы**

Наружно. Мазь наносят на пораженные участки кожи 1-2 раза в сутки (возможно наложение окклюзионной повязки).

#### **Побочное действие**

Аллергические реакции: жжение, гиперемия кожи, отечность или другие признаки раздражения.

#### **Передозировка**

Случаев передозировки препаратом не описано.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Значимого взаимодействия мази тетрациклин с другими лекарственными средствами не описано.

#### **Особые указания**

Не рекомендуется применять при глубоких или колотых ранах, тяжелых ожогах, в офтальмологии (используют 1% глазную мазь).

Следует иметь в виду, что использование антибактериальных средств для наружного применения может привести к сенсibilизации организма, сопровождающейся развитием реакций повышенной чувствительности.

Если в течение 2 недель состояние не улучшается, следует проконсультироваться с врачом.

Адекватных и строго контролируемых исследований у детей до 11 лет не проведено; дозы для данной категории пациентов не определены.

#### **Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 3 %.

По 15 г в тубу алюминиевую или в тубу полимерную из полиэтилена высокого или низкого давления.

Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель**

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4.

#### **Юридический адрес и адрес для принятия претензий**

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4,  
телефон/факс (8412) 57-72-49.

15500-0016-04

