

УТВЕРЖДЕНО МЗ РБ 02.08.2024

Листок-вкладыш – информация для пациента
Метформин Лонг 750, 750 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением (метформина гидрохлорид)

Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

Лекарственный препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная информация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша:

Что из себя представляет препарат Метформин Лонг 750 и для чего его применяют.

Чем следует знать перед применением препарата Метформина Лонг 750.

Применение препарата Метформин Лонг 750, возможные нежелательные реакции.

Применение препарата Метформин Лонг 750, содержание упаковки и прочие сведения.

Что из себя представляет препарат Метформин Лонг 750 и для чего его применяют.

Препарат Метформин Лонг 750, таблетки с пролонгированным высвобождением, содержит активное вещество метформина гидрохлорид и относится к группе лекарственных препаратов, называемых бигуанидами, которые используются для лечения сахарного диабета 2 типа (инсулиннезависимого). Препарат Метформин Лонг 750 используется для лечения сахарного диабета 2 типа, когда только изменений в диете и физических нагрузках недостаточно для контроля уровня глюкозы (сахара) в крови. Инсулин – это гормон, который позволяет тканям организма получать глюкозу из крови и использовать ее для получения энергии или накопления для использования в будущем. У людей с сахарным диабетом 2 типа не вырабатывается достаточно

инсулина в поджелудочной железе или их организм не реагирует должным образом на вырабатываемый инсулин. Это вызывает накопление глюкозы в крови, что может вызвать ряд серьезных проблем в последующем, поэтому важно, чтобы Вы продолжали принимать лекарственный препарат, даже если у Вас не наблюдается каких-либо явных симптомов. Препарат Метформин Лонг 750 делает организм более чувствительным к инсулину и помогает вернуться к нормальному использованию глюкозы в организме. Прием препарата Метформин Лонг 750 сопровождается сохранением массы тела на стабильном уровне либо небольшим ее снижением. Таблетки с пролонгированным высвобождением Метформин Лонг 750 разработаны специально для медленного высвобождения препарата в организме, поэтому они отличаются от многих других типов таблеток, содержащих метформин.

2. О чем следует знать перед применением препарата Метформина Лонг 750

Не принимайте препарат Метформин Лонг 750:

- если у Вас аллергия на метформин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша). Аллергическая реакция может проявляться сыпью, зудом или одышкой;

- если у Вас имеются проблемы с печенью;

- если у Вас снижена функция почек;

- если Вы потеряли большое количество воды (обезвоживание), например, из-за длительной или сильной диареи, либо если у Вас несколько раз подряд были рвота. Обезвоживание может привести к проблемам с почками, что может повысить риск развития лактоацидоза (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);

- если у Вас неконтролируемый сахарный диабет, например, с тяжелой гипергликемией (повышенный уровень глюкозы в крови), тошнотой, рвотой, диареей, быстрой потерей веса, лактоацидозом (см. раздел «Риск развития лактоацидоза» ниже) или кетоацидозом. Кетоацидоз – это состояние, при котором в крови накапливаются вещества, называемые «кетоновыми телами», что может привести к диабетической коме. Симптомы кетоацидоза включают боль в животе, учащенное и глубокое дыхание, сонливость или появление необычного запаха «прелых яблок» (ацетона) изо рта;

- если у Вас тяжелая инфекция, например, инфекция, поражающая легкие, бронхи или почки. Тяжелые инфекции могут привести к пробле-

мам с почками, что может повысить риск развития лактоацидоза (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);

- если Вы лечитесь от острых заболеваний сердца или Вы недавно перенесли сердечный приступ (инфаркт миокарда), у Вас наблюдаются серьезные нарушения кровообращения или затрудненное дыхание. Это может привести к нехватке кислорода в тканях, что может повысить риск развития лактоацидоза (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);

- если Вы злоупотребляете алкоголем;
- если Вам меньше 18 лет.

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- Вам назначено рентгенологическое исследование или сканирование, включающее внутривенное введение контрастного вещества, содержащего йод;
- Вам предстоит серьезная операция.

Вы должны прекратить прием препарата Метформин Лонг 750 за некоторое время до и после исследований или операций. Ваш врач решит, нужна ли Вам заместительная терапия в течение этого времени. Важно точно следовать указаниям врача.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Метформин Лонг 750 проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Риск развития лактоацидоза

Метформин Лонг 750 может вызывать редкий, но очень серьезный побочный эффект, называемый «лактоацидоз», особенно если Ваши почки не работают должным образом. Риск развития лактоацидоза также увеличивается при плохо контролируемом диабете, тяжелых инфекциях, длительном голодании или приеме алкоголя, обезвоживании (см. дополнительную информацию ниже), нарушениях функции печени и других заболеваниях, при которых наблюдается сниженное снабжение кислородом (например, острые тяжелые заболевания сердца). Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите Вашему лечащему врачу для получения дальнейших инструкций.

Прекратите принимать Метформин Лонг 750 на короткое время, если у Вас есть состояние, которое может быть связано с обезвоживанием (значительная потеря жидкости в орга-

низме), такие как сильная рвота, диарея, лихорадка, воздействие тепла или, если Вы пьете меньше жидкости, чем обычно. Обратитесь к врачу для получения дальнейших инструкций. **Прекратите прием Метформин Лонг 750 и немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу, если у Вас возникнут симптомы лактоацидоза, так как это состояние может привести к коме.**

Симптомы лактоацидоза:

- рвота;
- боль в животе;
- мышечные спазмы;
- общее плохое самочувствие с сильной усталостью;
- затрудненное дыхание;
- снижение температуры тела и учащенное сердцебиение.

Лактоацидоз требует оказания неотложной медицинской помощи и лечения в больнице. Если Вам предстоит серьезная операция, Вы должны прекратить прием препарата Метформин Лонг 750 во время операции и в течение некоторого времени после операции. Врач определит, когда Вам следует прекратить и когда возобновить лечение препаратом Метформин Лонг 750. Метформин Лонг 750 сам по себе не вызывает гипогликемии (чрезмерное снижение уровня глюкозы в крови). Однако если Вы принимаете препарат Метформин Лонг 750 вместе с другими препаратами для лечения диабета, которые могут вызывать гипогликемию (например, препараты сульфонилмочевины, инсулин, меглитиниды), существует риск развития гипогликемии. Если у Вас возникнут такие симптомы гипогликемии, как слабость, головокружение, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, нарушение зрения или трудности с концентрацией внимания, съешьте или выпейте что-нибудь, содержащее сахар. Это поможет Вам почувствовать себя лучше. Во время лечения лекарственным препаратом Метформин Лонг 750 необходимо контролировать функцию почек не реже одного раза в год или чаще, если Вы пожилой человек и/или если у Вас имеются нарушения функции почек. Если Ваш возраст 75 и более лет, не следует начинать лечение лекарственным препаратом Метформин Лонг 750 для снижения риска развития сахарного диабета 2 типа. Вы можете увидеть остатки таблеток в стуле. Не волнуйтесь – это нормально для таблеток такого типа. Вы должны продолжать следовать рекоменда-

циям по диете, которые дал Вам врач, и регулярно употреблять углеводы в течение дня. Прекращайте прием этого лекарственного препарата, не посоветовавшись с врачом.

Дети Не применяется.

Другие препараты и препарат Метформин Лонг 750 Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, не принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Если Вам необходимо внутривенное введение контрастного вещества, содержащего йод, например, при проведении рентгенологического исследования или сканирования, до процедуры Вам следует прекратить прием препарата Метформин Лонг 750. Ваш врач определит, когда Вам следует прекратить и когда возобновить лечение лекарственным препаратом Метформин Лонг 750. Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете, не принимали или собираетесь принимать какие-либо другие препараты. Вам может потребоваться более частая проверка уровня глюкозы в крови и функции почек, или Вашему врачу может потребоваться скорректировать дозу лекарственного препарата Метформин Лонг 750. Это особенно важно при приеме следующих препаратов:

- лекарственные препараты, увеличивающие образование мочи (диуретики, например, фуросемид);
- лекарственные препараты, используемые для лечения боли и воспаления (нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и ингибиторы ЦОГ-2, например, ибупрофен и целексиб);
- некоторые лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления (ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II);
- агонисты бета-2-адренорецепторов – например, сальбутамол или тербуталин (применяемые для лечения бронхоспастической астмы);
- стероидные гормоны, например, преднизолон, мометазон, беклометазон;
- симпатомиметические лекарственные препараты, включая адреналин и дофамин, используемые для лечения сердечных приступов, снижения артериального давления. Адреналин также входит в состав некоторых стоматологических анестетиков;
- лекарственные препараты, которые могут изменить количество метформина в крови, особенно если у Вас имеются нарушения функции почек (например, верапамил, рифампицин, циметидин).

рат **Метформин Лонг 750** с алкоголем
и/или чрезмерного употребления алкоголя
при приеме препарата **Метформин Лонг**
может увеличить риск разви-
тия тяжелой гипогликемии (см. раздел «Особые указания
и меры предосторожности»).

ление транспортными средствами и с механизмами

ваться ошороком, спутанностью сознания, повышением потоотделения) и, следовательно, должен влиять на способность управ-

...держит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на 1 г препарата, то есть почти «без натрия».

с рекомендациями лечащего врача. При возникновении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Применение препарата Метформин

по начальная доза лекарственного препарата

рата метформина (Глюкофол). Если у Вас имеется

Способ применения
Обычно таблетки Метформин Лонг 750 прини-

Наблюдение	Время	Возраст	Возраст
------------	-------	---------	---------

• Ваш врач также будет проверять, насколько хорошо работают Ваши почки, не реже одного раза в год. Если Вы почувствуете недомогание или Ваши

Если Вы приняли препарата **Метформин**
Донг 750 больше, чем следовало

это не должно вызывать значительное беспокойство. При появлении необычных симптомов обратитесь к врачу. В случае большой перело-

Если Вы забыли принять препарат Метформин Лонг 750 Если Вы пропустили прием пре-

4. Возможные нежелательные реакции

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000) Метформин Лонг 750

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000) Метформин Лонг 750 может вызвать побочные эффекты, функции

Другие возможные нежелательные реакции перечислены по частоте следующим образом:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

в крови (симптомы могут включать излишнюю усталость (слабость), воспаленный и красный язык (глоссит), покалывание (парестезия) блед-

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете

Республика Беларусь
220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Электронная почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by
Сайт: <https://www.rceth.by>

служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор). Телефон: +7 (800) 550-99-03

Храните лекарственный препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или контейнер для бытовых отходов. Уточните

Препарат Метформин Лонг 750 содержит:
Лействующим веществом является: метформин.

формина гидрохлорида. Вспомогательными веществами являются: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза, тип 2208) красная

Внешний вид препарата Метформин Лонг 750 и содержимое упаковки

ностью, допускается мраморность. 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки

Держатель регистрационного удостоверения и производитель. Открытое акционерное общ

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

Уверения: Открытое акционерное общество «Е

г. Борисов, ул. Чапаева, 64
Телефон: +375 (177) 735612, 744280
e-mail: market@borimed.com

Подробные сведения о данном препарате со-
д-
ж-
атся на веб-сайте Евразийского Экономиче-
ского Комиссии